




1. In 1475, King Edward IV of England  
and his Queen Elizabeth Woodville  
had a son, Edward, Prince of Wales.  
The King was very fond of his son  
and gave him many gifts and rewards.  
He also sent him to the best schools  
in Europe to be educated.  
The King's wife, Queen Elizabeth,  
was very jealous of her son's success  
and often tried to stop him from  
attending school. She believed  
that he would be better off staying  
at home and learning from his  
parents. She also thought that  
he should be taught by private  
tutors instead of going to school.  
However, the King insisted that  
his son should receive a good  
education and sent him to the  
best schools in Europe. He  
spent most of his time in  
France, where he studied  
French, Latin, and  
Mathematics. He also  
learned to play  
the harp and  
the organ.  
When he returned  
to England, he  
became a  
famous  
poet and  
writer. He  
wrote many  
books and  
poems, which  
are still  
read today.  
He died in  
1491 at  
the age of  
only 26  
years old.




folio 22

93715

d-1

{ 18



[1690]

medieval

James Colhoun.  
propriæ Exaruit  
Dextræ.

In Insula Rhana Anno Domini  
mille sixcentesimo quinquagesimo secundo.



John Colhoun.

1690  
1692  
1692



# De Melancholia Morbo.

2

Vix difficilis hic morbus natura, rauta et curatione, quip  
super alios omnes maxime exercet Medicis ingenium et  
meritum. Vulgo solet definiri, Delirium sine febre cum melo-  
et mestitia (quibusdam) circa unam rem obhaerens;   
qua omnia cui uera sunt nec us, particulariter expendamus.  
Delirium certe uidetur esse; qua tales mepta cogitant, et  
magis in cogitationibus uarianti ipsam in verbis aut acti-  
onibus, quamquam et circa hoc uerbius quandeque contingat.  
Sine febre] hinc pars non usquequam uita est, nam et melan-  
cholia f. tristia aliqd. Deprehensa sunt, qd affectus de ma-  
gnum gradum perniciem, eaq; febris uistar histeres est, sive ille  
ordine aut rhythmo intermissionis sua aliqd. felius etiam est  
continua, et deinceps melius definiendo est sui mentione febris;  
cum melo et mestitia] affectiones hie o. st perpetuae, neque  
cum cum miscet, primo, neque cum ad maiorem uiget melan-  
choliaj addit mela et mestitia; nam si posteriori ca-  
sa cuiuslibet manifestum manutinetur, aut qui statim talis  
fatuus est, non de hunc dura mastum. Circa unam rem  
obhaerens] neg; hoc est perpetuum. Exemplo potest ex mulier  
quidam Loreda que semper diebat se in operi handicraft ma-  
rituram (sciat a Melancholica) cui ex aucta morte conting-  
it 24000 Floronum, quo relieta pueri quietula, ut  
pot est satis fuit factum, eredit protinus in alienum,  
dictatq; se de honestamento fari toti familiis. Delirium  
hoc vniq; ueniat hoc cum his labore. Hinc quod fu-  
mus

multus schismi paret, si ipsa natura et nos tenet. Longiorum  
metantheliorum magnopere de memoria infirmitate, que tales tam  
est, nisi informam dictas illas que nequeat nullius millionis specie  
quod fuit ipsa obversantur debet retinere. prout etiam ploramus  
unigenitos et cogitamus ut Deum ex Tyrannum et opusmodi, sive quis  
erat qui ibi loqueretur: Desperant de salute eterna: oia parva  
magis astimant, cum si quid ingrum est, prolatum diabolum, de cunctis  
patentib; aliisque monstris mortis, vel uana et aegritata imaginantur:  
ut is qui granum hordei se ex patenti uoluntate in conspectum gallinarum  
nuncio ut ab ipsis veneratur. In hisce seu solum se uolant et con-  
queruntur: 1. ut fortunas perdant. 2. ut de honoris erident. 3. ut mactum  
amittant. 4. ut in alterium damnentur. Causa hujus affectus in 2bus res-  
sistit potissimum: in parte n. resipiente vel in specie recepta. Vitium in  
parte recipiente est intemperie non fugida, qua fugiunt non adeo uehementer  
meuant ut accedit in manuacis qua impetuosa et magna vi meuant.  
non humida, quia sic aderit corpori et sonde loca, rufes contractum est  
in hisce qui per dant id est uigilant. Intemperie a vita fessa est, cui  
ploramus comes est calor. Quod fessa ipsiusmodi sunt vel inde uidetur  
quia ualentia formae et testis apparent, et etiam ex quod tubus maximi  
humidi faciuntur ut Cassia. Vitium in specie recepta est duplex: vel est  
ipsius species uitium est modij per quod uenit specie. Haec specie uitium est  
quando pectus nimis est illustris: hoc a. acc. et vel quia approbundatur  
pates cum animi affectu, qui affectus facit ut sapientis speciem apud nos cognoscimus;  
vel quia specie est noua; hinc est quod monstrorum non sunt obliuiscuntur, vel  
quando specie est frequenter cogitata ut Mortator de mortatura. Et haec  
modij est uitium in ipsis spiritibus mobilitas se et densitas que addit ad re-  
bus motis, quod inde est in metantheliorum et manuacis. Et densitas etiam  
confert ad beatitudinem cogitationis quia ex ita facile dissipantur ab eo phre-  
nitatis, quia in hisce est spirituum temeritas et preuido in auctor ipsorum dissis-  
picio. Ex motu et spirituum rebibi vel ipsis exercito ut patet in studiis sui  
nominis Student. Unde a. metus et metuenda porro magis. Hoc mobilitas  
est diffusilimum vitia. Contingit a. sit spirituosa vel ex oblecto rauca testi  
pudicis et plenis: quid sebi magis astimant, vel testi ex sentient quamvis ex  
se tale uolent, et hoc ex Galois sententia fit, quia ipsi operatus sunt hui-

lumbrosi, et lundi; id est species tumefactae faciunt que per ipsos intrant, et  
hoc non induit. vero absimile, nam post idem fabarum triste fere somnium quā  
est corarium non sit affectione motus etiam contingat ex constictione cordis et hinc  
est causa peccissima, quia nullus conformatio melancholica est qui non est aut su-  
perius orificium ventriculi non sentient aliquam constictionem aut angustiam;  
et non nostra querimus taliter constictio et una morsus est, et non est  
melancholica est, et qui non habet, non est. Et implastrum quod atomi de-  
rebus sentiat, et tunc affectione sentiat, aut si exhibuerit nimis melancholico-  
genitus vel in centro vel in lato corpore: prius rarus est, posteriorus frequen-  
tius malum. a lato corpore propagatus deinde per arterias ex lata massa  
sanguinea; nam constitutio sanguinis melancholicorum. Ita diversa ab aliis  
sanguinis. Si e. in nos effundatur, in fundo nigrum major consupitur, nigris-  
do a. in aliorum sanguinis exquisitus toti permiscitur: Strid sanguinis que  
in sanguine rubent, in melancholico resplendent. Sanguis porro melancholi-  
corum arteria globuli innatae sic quando in nos resipitur, non ut in a-  
liorum sanguine contingat. Vena porro melancholica habet quasdam ni-  
gras fauillas in fundo. Sed quae venae et quales sit illa sanguis melancholicorum  
qui melancholica rara est. Et talon hominum videt, hoc opus hic  
labor. Et dicunt alii, præstidam vel genitum est somniorum, melancholiam  
in hepatis operari, et corporis summa et sanguinis somniorum ab hepatis n.  
rectorem, sed rara non meatur in hepatis, quia trahit ipsum transit, et  
s. pax non habet contactus quia ipsum respicit. Melancholica quando  
propter unum in corpore ex superfluitate nigra excedente aliud in quibusdam  
sed de rebus hic nobis forma est. mel melancholica rara est pars sanguinis he-  
patico: post coctionem cordes relata, sed quo loco non sanguinis pars  
tobis morsus deo possit, hebrei symptoma producunt. Considerandum e. in  
hoc tertio modus sanguinis: tartaro et amara et inesse, serum se subtem et  
spiritu raro ut ex sanguinis distillatio patet. Tercia uero factus motus quia  
nimis rara est ut sit motus: profundus motus aut operacum que sunt a me  
lambentes et rara mel melancholica sunt lapidantes meque sunt ignari. Sal non  
sunt mel melancholica, quia calentur, ex parte non sunt mel melancholica. Et tunc  
et i. certus aerat, non reverberat nobiliter aut rares aeris. Tercia  
e. serum motum et symptomatum est spiritus ardenti, et quando nihil  
adhesivum aut subtiliter operationem aut remittit existet quo  
pertinet aero operari. Vnde a. est hoc ardore in sanguine  
et a mitio rara vel effusione vel rara que rara est rara

composita et afflentia ut omnia. sed impossibilitatem non habet. sed  
mox resipie et impossibilitas existit vel que non sicut debet est vel  
est. Ita ergo quoniam preceps et fuit spiritualiter vel  
ante hanc non sit que pro inducere ab igne domino aut factus ambo  
spiritus vellet et faceret. si usque hunc inducere vellet  
fuit que ambo spiritibus erunt hinc prius. Vnde omnino  
gratus talis non cum se impeditum togatum possum non impossibilitas et  
impossibilitas debita est cum inducatur non impossibilitas. Et secundum  
excedens et impossibilitas talis ratione et modicis (cum talis non  
potest quidem ducere sed agere regere tamen) talis natus impossibilis  
et impossibilitas spiritualis qui impossibilitas existit in meo carnamento  
ut fuit albo, genere horum scilicet ubi spiritus me exiret quod  
venire facit melanoleuca et nigrum et impossibilitas sibi exire  
est in carnamento nigrum utrumque impossibilem. Tertium  
fuerit melanoleuca et ultimum est impossibilitas cordi debiti natus; quia  
tunc sicut sic natus ob subtilitas permeantur et formantur. Huius  
impossibilitas et sequitur malum remissio. huius impossibilitas est quia ante  
et assumitur vel quia ardorem et congelegationem ut in obstruere  
lumen vel quia condensatio non ob angustiam circum unde metu  
et oblitio non impossibilem impedit ut quod afferat inservit et operatur  
in nata ex qua evaporant et hoc evanescit in cordis nimirum non  
stanchetur ut si pectus nimis fuscatur in particulari potest non impossibilis  
ad 24 annos post semper fuit melanoleuca ob angustiam et ob  
fugacit et lumen. Tali exempla impossibilitas sunt in multitudine  
et impossibiliter.

Mons. melanoleuca primo mense ageruntur deinceps  
poter solitudo quareunt, mox quoniam uiuant. deinceps  
deinceps se optare mori; a poter deinceps et rube abstinent  
deinceps manus sibi concurrit in ferre. Vigilijs et nocte rebatur  
et constructionem circa Cor late corporis dorso. Solet fieri  
affactus deinceps bis in anno vero scilicet autumno; quibus nigrum  
est. nigrum poter optime. Si affactus primarius erit

st, tum dolor aut propositus sed hoc affectus raro. 4  
Solutio p[ro]l[ongata] p[er]lunga d[omi]ni: q[uod] ad salutem tendit solutio  
angustia circa cor non est modo inserviet.

Cravis molam h[ab]eb[us] produnt fortissimam qui a iuxta angustiarum  
et fit fulcitur pulmonum qui a stagnat illis locis sanguis  
Tenunt nonnunquam hydrospicil quia serum sanguinum non  
benignus primis citius quia crassus est abusus ob defunctionem  
hemoris atri et spirituum.

Sig[na] sunt obvia. Constrictionis circa cor causam  
q[ui]d scroti in r[espiratori] sp[iritu] ab abs. erant in dia  
phragma sic in testicula idem spiritus fluerat per  
venas ad cor illiusque constringunt.

Curo melanfolia plenaria ad hoc inventa est  
Paroxysmum in secundum remittunt sed videt morbus. Eo  
qua urgent morbus, causa vel symptoma non; Ex  
his symptomata magis iuxta a. sunt delirium mactitia  
et mitis. Corrigimus dolorem forti in contrarium pro-  
sulatione vel matutino motu. diffusa sternitur curatur  
tunc non asserimus quod illi sic hoc non semper succedit  
cum de melanolia inveniunt prius remedium ualeat  
Metum tollent Secunda sp[iritu]sque lucidos parentia  
et corallina perlata cornu etiam vel unum aromata  
præbentia uero cinnamonum et cerasus. iuncte odorez ambra  
et incensum. Corallum quidem forma pulchra et tabellatum  
vel atro in omni forma, Vinum potenter hoc effect.  
Crocus ad 9p. Aquae cinnamoni 3j. si melanolichii sint  
cubidi emuntur o[ste]no et aromatis h[ab]ent enim p[er]fumum  
marinari fiant; Alias sp[iritu]s uini in quo Juniperi succo

fumigatae

infusio, ualeat. Multo et plurimum ambra fuit non  
moschum. ambris gr. ij. manu. et uoppi; moschi tandem. poter-  
tissimum est opium in theria et milordatio non adeo ualent  
absynthium rad. cor. et cunctorum.


Syphilita curando curamus et rausat que spirituum est don-  
sitas in molanthelia primaria uerbis angel.  
Materie conditae ex fraganda et curando. calofacientium item et  
humectandum.


In alijs morbis purgatis preparationes praeemittimus. In molanthelia  
uero purgatis minime non seruus habet. Preparationes sunt attenuantiae  
ut borago, buglossum molle, Eupatorium aquat. ~~et~~ siccata  
het radic. capparis taenialis, chalybs, antiperbutica et arctus  
sollio minima alium. apertivata et constricta ex ijs finit. Corolla  
baraginis praestantiae est folior. derecto. derectum Eupatorium  
canabini, rad. Capparis chalybs magnopere estimantur, ab eo  
tumori uirini quoniam uigilant humores quos putator expungant.

Chalybs utriusque chalybs infusio circuifera. Exempli  
gratia Chalybis zii iudicatur potio laeta et in circufo pa-  
dies 2 horas, hoc optime humores diffundit. Flora carduus  
benedictus, absynthium, rentaur. min. in derecto. antiperbutica  
non ita praeuallunt; optimum tampon est castum aquatum.  
alium optime Lacte preparatur derogaturque ad diuidias per  
huc horas. An inter preparationia accidit locus datur? Est.  
Si molanthelia calida est, aridis locis est. et quam in frigido  
si parvo quantitate infusione. Accidit usus est. Et D. Walter  
ut sunt Spirit. nitri, sulfuris, vitrioli, salis. omnibus praestat  
spiritus sulfuris; illi secundus est nitri; reliqui e ista commodi  
preparato corporis educimus humeros vel venos perstringit vel  
purgationes; prius auxilium non ualeat nisi in natura rebuonib;  
sed posterius optimum est et omni tempore. Institutio a cui  
ratio per os vel per anum; illa per uomitionem aut. sedem / capi  
Rist

haec Chystes per secessum. Vomitum optimo momentu tritichum ut  
 in infusum antimoniij, usq; non ita sedatus paroxysmus per 6 mons. p.  
 Chystes 2da uultur serum; frequenter injici debent ut his ad  
 di' 24 die. spacio. Optime succedit purgatio et diuonisima et  
 epulchymo cum prunis. Laxantia optimo conuenient ut Cassia et  
 pruna ut et bellaria quemadmodum sive Colocynthia et canino-  
 nium bellborus. Laxantia o' debent solitariae a suspensi in admixtis  
 uellentibus ut colocynthio uiluti in refectione formid. Ea  
 que recte fermentant ut colocynthia bellborus tantum in  
 infuso suspensi debent. 2da bellorii infusio post hunc diuum  
 infusionem ad coquib; in uine datur cum Faloppo et diaquadio.  
 An ad qualitercum commoda sit non est multum disputatur.  
 In fontanellis o' est magno spiss; quo Laborum humor li-  
 uior ex uirina. Quidam encubitalis in fronte utantur et  
 fontanella in brachio sed fustra. Inani etiam est circub; li-  
 beratio ut et erikina. Intemporem suam corrigentia sunt  
 ex aqua, humerantia sc. ut calvina ex lactura myrrhae et  
 similibus. multum praestant aqua spadana. Virum apud istas  
 aquas plus ualent colliguria Iocis et ruminis novitatis admixtis.  
 Somnus etiam multum confort qui therioid provocari debet. Du-  
 ratione quo circa ventriculi orificium sentitur molle emplosthum  
 ex styx et mili cato.

st. st.





James Colchonius.  
anagr.

Hui! noces? Lino, Sano.

Lens Hui! sanone Noces? non. Sanog, Lino.  
Non sanos sanans est medicina nocens.



**D**e febribus liber Unicus

Auctore D.D. J. Walæd.

Caput primum

**D**e febribus in genere.

Febris potissimum  
cognoscitur ex  
colorate pulsso

Febris cognoscitur ut alii  
morbi, vel ex actione foesa, vel  
ex excrementis vel ex simplici  
corporis affectu.

Non cognoscitur febris ex solo  
corporis affectu simplici, quia  
nulla febris ex solo corporis  
colore mutescit.

Non ex excrementis, quia urinæ  
et foeces aliquando sanorum  
instar sunt: sed ex actione  
foesa, nam certissimum febris  
signum est pulsus debito modo  
et tempore celer.

Febris est pulsus celeritas ob  
errorem externum.

Ut febrium essentiam cognitam  
habemus, debemus aliquod eius  
inseparabile signum habere, quo  
posito ponitur febris, et quo abla-  
to iterum cessat. Non autem est  
pulsus color debito tempore et  
debito modo.

Causa pulsus celeroris est duplex  
primo quia aliquid citius cordi-  
fit, molestum, ac prouide exle-  
rius a se propelet. Secundo  
quia cor mouetur motu animali.  
Molestia illa excitatur in corde  
vel ab humore calido, acri, vel  
maligno.

Humores illi vel in corde prius  
(calore eius dissoluti) suam acri-  
moniam manifestant: vel in fo-  
co aliquo dissoluti ad cor per-  
uenient.

Signa febrium generalia sunt ut et lassitudine

confusa et ubi  
so humor vel  
prout animali  
irruente in cor

(5)

8  
calore calidum minatum afficitur.  
I pulsus calor, et siccus inaequalis  
in pluribus pulsibus; nunc minime  
tardus nunc dolor est: quod totum  
dependet a diversitate materiae  
ad eorū nōcidentis: secundum febris  
um commune signum est lassitudo  
vel uirium laetior, qui  
iterum duas accedit ob causas.  
vel quia materia febrium irritat  
musculos, vel quia materia est  
qua spiritus uitales et animalis  
generantur; in quinaria est. Ter-  
tium signum est calor manifestus,  
quod tamen non est perpetuum.  
Febris essentia non est calor;  
quia rigor, horror non tantum  
intum febris sed ipsa febris  
sunt: habent enim pulsus ce-  
lerem. Tantur quoque febres  
in quibus non apparet calor:  
calor enim in habitu corporis  
non est febris sed febris effectus.  
Calidum minatum etiam affectat

in febribus, quia ei quid communum  
est cum elementari; quod inde  
liqueat, quia ab elementari  
fugore calidum hoc immatum  
extinguitur: ut medicamentis  
refrigerantibus, ex quorum  
mino usu, post febres, fere, hy-  
drops sequitur.

Calidum immatum a preterna  
turali calore non tantum  
augitetur, sed et iumentum  
et cum eo idem sit.

Calor fibrilis non in corde  
accenditur (mota enim in  
moto brevis est et) sed in hu-  
mido. Nam in foco, uel in ipso  
corde, ab ipsis calore dissoluto,  
et eor uellitante.

Siccitas non est de essentia  
febris; nam in synocha et  
quotidiana quedam est  
humiditas.

Quod spiritus animales uario  
effluentes.

*sputum siccum  
ingumentum in*

9.

cor probant  
animi affectos  
febrium nonum  
confos. affluentes sunt causa celerioris  
pulsus, patet esse animi affectib.  
unde sepe accedit ut in Pongi  
orbis animi perturbationibus,  
spirituum influxione, pulsus  
continuato, ex motu isti aff. mutato  
suscitatur et definetur illa  
passione, nihilominus pulsus  
cum seruat qui primo ab  
iste animi affectu introdu-  
ctus erat.

Inequalis pulsus fit cum  
materia nunc calida et  
aeris, nunc frigida et mali-  
qua: nunc paucior nunc co-  
piosior ad cor fluit: ex  
cuius materia maiore vel  
minore irritacione, pulsus  
necessario variari debet.  
Inequalitas in uno pulsu  
magmaria tantum est.  
Maior calor in alia parte  
excitari

(6)

excitari potest quam naturaliter  
in corde est. V. s. dum caro  
crematur, in peste, unde car-  
bones frunt.

Februm differentiae interae sunt  
aliae et expectae: imaginariae  
aliae. Differentia vera est  
duplex una ratione causa,  
altera ratione modi. Rati-  
one cause, febris uel est  
calida que solum calorem de-  
se promitt; uel acris seu pu-  
trida que et acrimoniam si-  
nul; uel est maligna que  
multa prava symptomata  
habet. altera ratione modi  
sicque febris continuus est uel  
continua uel intermittens:  
continens continuo et aequaliter  
affligit: continua modo magis  
modo minus afficit intermittens  
per remittit.

febris distincta  
quintam raro  
uel re

Imaginaria

(7)

Imaginaria ratione febris materia  
est febris in spiritu quo diaria:  
int humores, ut putrida humoralis:  
in parte solida, ut hæstica.

*Modus generationis*

*febrium.*

fumis a velo  
sanguinis ad cor  
velo reciprocis  
concreta.

Materia ipsa febris ad cor per  
venit raro per fuligines; nisi  
per fuligines tenuiores sanguinis  
portiones intelligantur. Venit  
autem ad cor ex omnibus cor-  
poris partibus; nam in extre-  
mis partibus sicut venulae ex  
quibus facile circulatione ad  
cor perveniat.

Materia illa non accedit intem  
peruenit in corde, ut postea inde  
toti corpori communiceatur. Si  
enim intemporens in corde accen-  
deretur; a materia in tertiana  
piena longior paroxysmus esset  
quam

(8)  
quam in notha, quia pura notha  
intolerie calida superat: cuius  
tamen contrarium cilibet patet.

Causa paroxysmi est materia  
febrilis ad cor accessio, quaer  
quamvis parva sit copia, satis long  
gum tamen paroxysmum efficit.

ratio est. quia unum quod in cor  
dis ventriculis contineatur, uno  
impetu non expellitur; sed tantu  
pars eius decima sexta proter-  
propter; et proterea bona  
materia a nitosa in corde con-  
taminatur, sensim tamen bono  
aducente sanguine, et superan-  
te malum sanguinem cessat  
paroxysmus.

Materia a corde, postquam eius  
ventriculos transiit, in eas parkis  
in quibus alias aliquid cor depon-  
nere solet, propellitur: in quibus  
tunc naria existantur symptomata.

si enim

qui postea in  
unum responsum fit  
elubens maximum  
affectione author  
existit.

11

si enim in ventriculum aliquid  
accidit, fauorem caninam  
excitat. si in os, fitim si biliosa  
materia in ventriculum, vomitione,  
nauseant. In aluum, diarrhoeam  
procreat. Si in vesicam, urinam  
alterat. In caput, dolores. In  
omnibus fere partibus, se febrilis  
est materia, rigorem excitat. Fe-  
bres autem calidæ, putredine et ma-  
lignæ, possunt esse continentes,  
continuae et intermitentes: pro-  
ut materia hæret vel in uasa  
liberas vel extra uasa in conclu-  
sis locis, A celiorum vel tardior  
in uasa libera regurgital.

Caput secundum  
de  
Ephemeræ

Diana febris uaria  
sunt operae multæ  
animalia et sanguis.  
Signum pathognomonicum ephes-  
meræ est quod uiginti quatuor  
horas duret et tunc soluatæ  
Quum.

quam autem tria ad cor naturaliter  
veniunt: spiritus uralis, animalis,  
et sanguis Ex iis non bene se ha-  
bentibus diaria fieri potest.  
Spiritus animalis molestat cor  
contumenter in id influens. Spi-  
ritus uralis cor molestat. 1. qdō  
calidi facti sunt et quasi igni.  
2. quando nimis in alienam  
naturam mutati sunt. 3. quando  
putrescent.

Sanguis diarium facit. 1. quando  
lentior aduritur. 2. quando in  
aerem mutatus est naturam. 3.  
quando aliquis putridum vel  
corruptum in eo habet sique  
permiscetur. permiscetur autem  
sanguini: aliquid, vel quod est  
naturale vel quod est proter-  
naturale. Naturale ut chylus  
acer et corruptus, vel a parte  
concoquente vel ab ipso cibo,

bilis

*hic leviter datus  
2 acris factus. 3.  
cum putrido mixtus.  
sphacelam facit.*

bilis, excrementa alii, menstrua  
supprepta, excrementa tertiae co-  
ditionis retenta ob cutis consti-  
tutionem. His adde uermes su-  
breos. Proternaturalis vel  
materia purulenta in parotidis;  
angina, bubone, etc.

*Curatur purgatione  
et refrigerantibus.*

Si a putredine oritur, purgatio  
est inservienda ex mamma cassia  
et tanacardia. Raro fructus  
dantur quia corruptionem mo-  
tuimus. Aqua frigida propter  
partium debilitatem et obstruc-  
tionem non exhibetur. Cassia  
sola ventriculum debilitat-

### Caput tertium de synocho imputri.

*Synochus imputris  
quis et cum putrida  
videt subiectum*

Continenſ ſeu synocho in  
genere eſt uel brevis ut Ephimira  
uel longior

(12)

uel longior; ut synochus impudicus.

à diaria rafacione intensior differt

uel longissima ut synochus putida.  
quæ qua admodum acris est, reli-  
quo duo inter mitis recessuntur.

Signum pathognomonicum huius  
febris est duratio per quatuor  
aut quinque dies.

Causæ huius eodem sunt que  
ephemeram producent, sed inten-  
siores. 1. Spiritus animalis à  
cerebro contumenter, ob animi  
affectionem, in cor influens: quod  
aliquando ad hanc quatuor aut  
quinque dies durat. 2. aliquid  
contumenter tandem cor lassipes.

id autem est sanguis corruptus  
uel per ustionem vel per putredini-  
mem leuem, vel mutationem in  
alienam naturam: quarum duo  
prior corruptiones leviores tantum  
essent. 3. alia que

Sanguini

(15)

sanguini per missentur; ut frequentis  
sunt excrementa tertie concoctionis,  
mrustua, hilis: raro alii foeces  
et materia vermorum. non vero  
chylus et in diaria: quia non  
raro est febris per tot dies  
extenderi possit.

Et quando conti-  
nent sit a cibo tan-  
non et sub febre  
exacerbatur

Sanguis a. propter naturam offe-  
ctus est in toto corpore, sed  
placunque incipit ab una aliqua  
parte. Incipit haec febris placunq;  
cum horrore et rigore.

Iuvans haec febris sit continens  
tamen a pastu et sub insperata  
exacerbatur. circa insperata  
qua pori tum ordinarior coact  
antur, ac prouide fuligines au-  
gentur. a pastu quia tunc  
augetur calor.

Solutur frequenter aut sensim  
aut cum sudore raro haemorrhagia  
aut deictio

Vima si a bili est plorunque sedimentum habet

Synochus putrida

C. Intensiones sunt . vacuare sanguinem si copia adsit, si vero falsi aut biliosi humoris in uenis sunt, et sanguis admodum paucus, purgatione singulari accommodata tollendi sunt. postea Iulisia ad temperandum sanguinem usus pandae sunt. si vero nec sunt plas- ni cessat sudoriferis, ut Diastore, sale absynthii etc. Reliquum est abigendum.

Crotal uiridibolivis pro- gatione sudoriferis et refrigerantibus.

#### Caput quartum

de

#### Synocho putrida

Signum eius pathognomonicum est quod duret ultra quatuor dies. Causa immediata est ipse sanguis corruptus ab iisdem causis quibus

Synochus

Intendo continere causa sunt uero mentis mori; partim se sanguinis separa- tricium.

Synochus putrida

(15)

Synochus mephitris sed in hinc mentioribus.

14

sanguis eius in ea est admodum ad-  
ustus et putrefactus. sanguis a-  
putrefacto uidetur, cum eius partes  
autem nuptio resoluuntur; ob quoniam  
resolutionem, sal sulphur aut ignis  
a mixtione libera suas uires exer-  
cunt: ac prouide uel calor uel  
factor uel acrimonia sibi manifestat.  
Causae huius resolutionis uariae sunt.

Sunt uitium, quan-  
tum, mala struc-  
tus, ut et pars,  
stipatus, farctus materiali compungatur aptum  
synecchi que cau- non est. 2. Copiosus cibus, qui  
sa putentis. a calore isti quantitati non pro-  
portionata, non ita subigi. 3. com-  
pungi potest. 5. partes male con-  
structae, ut si uentriculus, hepatis  
cor etc. debilia humoros non bene  
mixtunt inter se quendam. 4. Con-  
tactus aliquius hoc morbo laborans

quonodo obseruauit D.D. Waldis ab Febres Continuae

uno totam familiam hoc morbo in  
festem <sup>fecundam</sup> fuisse. & pars caldior  
que sua caliditate humores sol-  
vit. b. Obstructio et pororum  
constipatio, unde fuligines contenta  
patetrem inducent.

In tensiones sunt levire aluum,  
statim secare ueniam; postmodum  
purgare. Denique humores fugi-  
dis Fulapiss et emicibus quidam  
ualentioribus, quam in synocho  
non poteris, attemptrare.

*Carotus alium  
lomentibus phlebo-  
toma et purgantibus.*

### C apit quintum.

de

Continuis in genere et in  
specie.

Febres continuae cum continentiis  
sunt eadem ratione causarum a  
quibus excitantur, et ratione ma-  
teriau patescientis. Sed ratione  
locorum

*Febris continua et  
continens max et  
afficientes eadem*

Loco variante. locorum in quibus sanguis putreficit,  
difficiunt.

Sunt a continuæ hoc pacto. san-  
guis in uasis liberis corruptus fe-  
breum continuare facit; dum aqua  
liter, febre continuo ad eorū uenit  
idque virutat. Exacerbatione micro-  
febris continuo acquirit diuin corruptio  
in uenis sanguine, noua mat-  
eria patrofacta a parte seu face  
exiliorum massæ preuiscetur et ad cor-  
cum eo uenit.

Illius materia  
ratione loci sym-  
ptomatrica non ut  
primaria febrem  
causatur.

Putreficit autem materia illa uel  
in uasa conclusa ab aliqua parte,  
non uero totaliter, ut materia re-  
gurgitare possit in uasa libera  
uel extra uasa; unde duplē rati-  
one ad uasa remeat. uel quando ibi  
rarefit, uel copia augetur, ut in  
illa statione amplius se contine-  
re queat, ac prouide necessario ad  
uasa remeat.

Febres Continues

Materia illa utrofa et corrupta  
haeret vel in parte sensili i.e. vel  
qua extermis partibus inhaeret  
qua sensibus conspicuae sunt, vel  
qua eximis sensu sunt praeditae, et  
tunc febris sequens vocatur sym-  
ptomatica. Vel in parte insensibili  
ut sunt cerebrum, pulmo, hepatis,  
ren, mesenterium, pauceras: et  
tunc vocatur prima febris.

Ex his patet quolibet febres  
ex quolibet putrefacte humor  
fieri posse. sed fieri tamen quotidi-  
ana ex pituita: Tertia et bila-  
quartana ex melancholia ortur.  
Quod ad materiam illarum. In  
initio, cum materia corrupta ad  
cor uenit seculter quoadam auriculas:  
et qua cor in principio non bene  
se dilatat ob acrimoniam mate-  
riae. qua cor affligitur, et se  
continuo contrahit. Hinc

punctus

hunc pulsus fit frequens, celer, et  
parvus: vnde consequenter sentitur  
in partibus maxime exterioris quo-  
dam molestia; et impinguis in na-  
so et in pedibus, quia ista partes  
non ita iam sanguinem accipiunt  
sicut ante.

In principio autem paroxysmi cum  
materia a corde propeletur in  
habitum corporis, facit aliquem  
horrorem.

Cujus symptomata  
sunt nausea, vomitus  
et desolata appetitus.

Symptomata febris sequentia sunt  
cum materia certa propeletur a corde  
in ventriculum; nausea,  
vomitus, desolata appetitus: cum  
ad fauces et oris interiora sitis:  
cum in caput, dolor, delirium etc.  
in intestina, diarrhoea. Quando  
per uenae transcolatur portio quedam  
cum sero; raque si sero exakte per-  
mixta sit, reddit urinam tenuem  
absque sedimento: si non permixta  
sit exakte facit sedimentum.

tabes: morbi: per  
morbis vacant.

Feventum quod attinet. periculosa  
ad modum est quotidiana conti-  
nua. quia si purgas. si pothyma  
sequitur. si non. idem contingit.  
Imo omnes febres continuae pericu-  
losa sunt ob continuum afflictionem.  
Febres continuae in quibus continuo  
sudor est non sunt periculosa; nisi  
ex infelicitate uruum sudor proce-  
nit. Sunt et frequentiores quam  
continentes. si febres continuae post-  
ponuntur. statim periculosiores sunt.  
Judicationes sunt. ut post primum  
paroxysmum. purgans. exhibeatur  
validum ex secundum quo. aut alio  
medicamento valido. tunc e. uitiosa  
materia nondum sanguinis bene per-  
mista est. post secundum paroxys-  
mum uena secretur. Tertio paroxys-  
mo aliquid conueniens fulapium ex-  
hibeat. Quarto paroxysmo quonia  
egri tunc possunt se habent. nihil  
proscriptatur. sed quod praedicti poterit  
praedicatur. Quinto paroxysmo dentur  
valida

purgationes: uito  
inde fistulas: fulapies:  
sudoreferis: extremos:  
fistulas: mao: con-  
coctiones: curantur.

valida sudorifera. Interim si non coll-  
ent febres pro ratione cuiusque id  
exigentibus faciendum. Imprimis quo-  
tidiana continua a pituita lenta,  
curatur fricando pedes, et brachia,  
sic e. materia immunitur. Datur  
a. ad eius coctionem unum Risspa-  
nicum; et ad eius evacuationem  
pilula ex aloë cum chalybe-  
nitriolato.

Caput 6.  
de  
Febribus intermittentibus  
in genere.

Febribus inter-  
missione accedit ob-  
materiae vel paucis  
tatem vel benignitas  
tem, vel influens  
litteras vel partis  
insensibilitatem.

Febres intermittentes cum conti-  
nuis eiusdem sunt generis et quo-  
que eiusdem curationis. Suntque  
intermittentes propter obsequen-  
tes causas.

Primo si materia sit pauca.  
Secundo si sit benigna, ob quam  
benignitatem

## Séries intermitentes

and estimating a certain number of individuals in each  
of the various categories of which we have  
the estimation of the total number of individuals  
in each category. The estimation of the total number  
of individuals in each category is based on the  
number of individuals in each category and the  
percentage of individuals in each category.

Febris intermitter-

tes sequuntur potest facilius discuti,  
nec aliquid intus manet inde motus  
accelerari possit. Si materia dispu-  
ti non potest febris motum acceler-  
at, quod inde apparet, quod illi  
qui intermittenti febre laborantes  
se deuidant, postea continuo in-  
festentur.

Testis si materia sit iniuncta fluxibilis  
Quarto si pars sit minus sensibilis.  
si vero max sit maior copia, ma-  
simum, fluxibor et pars sensibi-  
lor, continua potius oritur.

Hoc dicunt originem. Cuiuntur autem a virtuoso humo-  
re in sanguine existentes qui  
sanguinis qui vel  
z legnum vel al. ubi ad partes quas natura debet  
peruenient, ibi accedens i primo ut  
conversat, nec potest parti assimilari:  
quare a calore et spiritibus vitas  
leibus alteratur et patrificit, et  
hoc modo constitutur focus febri-  
lis. ad hunc focus quequid  
venient, sine sit purus sanguis suo  
cachymen

carochymicus, mutantur in similes. Febris intermitens  
 patredinem et sit materna, febrilis. les.  
 Materna autem haec turbescens et  
 putrescens aequaliter requirit sanguinem.  
 quandoque foco transit in pores  
 cutis, in quibus motus est sanguini-  
 us, sanguiniique confunditur, et  
 cum eo uenias nutrit, et ad cor  
 uenit. Et in statim ouatur flegma; unde flegma  
 quia cor dum mollescam eam sentit,  
 se amplius expandens preparat ad ma-  
 teriam ipsum molestum ualidiori  
 pulsu longius propellendam. Dumq;  
 cor ita dilabitatur, sanguis et  
 spiritus ut antea non ad partos  
 tollentur; unde necessarie flegma  
 in illis ouatur. Et secundo ouatur  
 flegma, quia in materia aspera et  
 acris, que tamen ualida est, fa-  
 cit regorem; unde agri putant  
 se flegore. Mitigata autem ma-  
 teria aliquo modo a calore cordis,  
 repellitur ad corporis habitum,

materia a haec

et quia

Febris quotid. inter-

mittens  
toties a cordo  
agitata ab  
in  
sudore.

A flexibilitate a-  
materia paroxys-  
num pondere  
restimans.

et quia acris ualde est, partes son-  
tantes quas attingit, pungit: qua pun-  
ctio hororum et rigorum in febribus  
facit. Materia autem aliquoties cor-  
transgressa usque calore attenuata  
abit in sudores et sic fūntur paroxysmus.  
Quod autem statim periodicē redit  
paroxysmū, id crediderim per diuinā & flexi-  
bilitatem materiae, qua pars temporis  
nisi agens ambientar̄ aut alio accidente  
impedimenta, patrificat et flexibilis redi-  
ditur. Neque hoc tantum patet a  
materia sed et a partium conditione.  
Vnde ex quolibet humorō quilibet  
febris nascitur. Duo materna citius  
est flexibiles, eo citius paroxysmus oritur  
quo languidior, eo tardius.

### Caput septimum

De

Febre quotidiana intermitente  
duilibet febri  
diuotidiana tertiana quartana et  
si quis

si que dantur alia a quolibet humoris  
putrido venenis possunt, idque manu  
fessum quadrat ex signo humoris  
peccatum denunciantibus.

intervallis a  
quilibet humoris  
orbi potest

Maximus autem ortus quotidiana  
putrefacte pituita; tertiana a bilis;  
quartana a malachola. Quotidiana  
aliam agnotha; alia est uera. No  
stra est que orbatur ex permixtione  
bilis cum pituita, cum tamen pituita  
dominica habeat. Vera est qua a  
solo pituita procedit. Pituita autem  
excitans quotidianam potest esse  
omnis generis excepta utraea crassa  
excitatur etiam utraea temis ex admixtio  
ne spiritus aeris humoris aquosus  
quaer potius excitat quartanam: ne  
que etiam ex gypsea ortus quoti  
diana.

ad hanc febrem portunt febris syn  
copalis orta a pituita in nutri  
culum incidente, quo si quoque  
in centrum incidat, torporem in  
ducit. In hoc autem loca febre  
semper

ad quotidianam  
reducta sykopatis

semper aliquo portio humoris percam-  
tis incidere solet, quia in illa natura  
racter aliquid accedit: ut in ventri-  
culum spiritus acidus: in cerebrum  
spiritus nutans. Exit a syncope  
cum comuta arterios orifici superior-  
es ventriculi, sua verimonia (nam  
fere de causa dictius pectora) afficit:  
nudus. Lipotymnia subsequitur.

Illa a purgatione  
curatur et cato-  
merum fictionibz

In quotidiana aliunt fere tarda est  
venae certio in hac febre locum non  
habet, sed alter purgantur, si  
Lipotymnia non sit motus, alioquin  
fricantur, pectorata medicinam, sudore  
re, eorum affecto cerebro et a.  
si humor proccans in cerebrum pro-  
babitur, magis purgantur, si vero veno-  
triculus fecerit affectus, fricamus.  
Euentus. Natura durat utrumque  
sex, septem septuaginta; pura ad  
quatuor monses extenditur. Septem  
si fetus syncope a bilis sit ortus,  
durat sive tres aut quatuor septima-

nas

Febris quoddam inter  
consumptos  
viro ex tristitia  
antimonij.

Si his medicamentis febris non cessat.  
sat. vomitorio ex fructura antis  
monij aut alio quepiam medicamento  
valido tentandum aliquid est.

Tandem hinc reducunt febrem Epiala  
quae uolunt a p. tuta ortam, tamq;  
dupliciter ponunt. Prima in qua intus  
frigus extra calor sentitur. Secun-  
da est in qua in eadem particula  
eodem tempore est simul et calor  
et frigus sentitur. Prorsus causa  
non est p. tuta intus putrefacta et  
refrigerans, sed accidit hoc ob in-  
qualitatem materie ad eorū uenientis.  
Si enim, verbi gratia, a corde pri-  
mo materia uictiosa ad habitum cor-  
poris recollitur, que ibi calorem  
efficit, deinde uero bonas sanguinis ier  
transit, qui resisteret, prius frigidus  
existit; atque ita in habitu cor-  
poris calor ob uitiosam materiam,  
in interioribus frigus ob matrem  
bonam sentitur. Posterioris causa  
est, non

*Febbris quotid. metu  
mittens.*

(297)

non situata nitida partim putrescens  
partim vero non: sed fit quando mas-  
teria febrilis calida ad partem propensa  
est, unde in iis calor postea acedo  
succedit, quam acerdinosa cum partis  
calide sentiant, frigus etiam falso est.  
Judicant. Euenit horum grandis rigor  
post febrem uenit. At haec mutatio-  
nes momentaneae sunt, nec dia du-  
rant, suntque rarissime.

Caput octauum.

De

Tertiana Intermittente.

Tertiana uero  
paroxysmus horas  
euodee, nocte.

Tertiana alia uera est, alia noctis.  
uera ex sola bile ortur, quam  
cor undique possit. Si biles per-  
litur in ventriculum, anorexiam; si  
ad caput, cephalalgiam facit.

Noctis, quo frequentissima est, ex  
admissione pituitae vel melancholia  
et biles ortur. Symptoma et  
signa uerat, prout hic vel ille  
humor periret.

Longissima accessio tertiana exquisita. <sup>Feb. quart. intermissiones</sup>  
horarum est duodecim, interdum  
septem vel quatuor.

Accessio noctis ultra duodecim horas <sup>plures dies</sup>  
nuncium exporrigitur. <sup>durat</sup>

Si magnus est ardor, et uires forunt,  
uena factio habet locum, deinde pars  
gans et sadorisera suo tempore adhuc  
genus. <sup>vtaq; curatur  
uendit. purgan-  
tib. et</sup>

Anticipant noctis tertiana horam  
unam aut duas. <sup>s. dolorifit.</sup>

### Caput Nonum.

De

### Quartana, Intermittente.

Continua quartana uix obtinguit. <sup>Quartana, febre</sup>  
causa est quia materia a conti-  
nuo isto calore flexilior fit, quam  
ut quartana typum obseruent: sed  
alium typum assunt. Intermittens  
frequenter est. oritur enim uis  
ab humoris acido peccante, vel mi-  
lancholia, vel a pituita crassa:  
<sup>Laborantes</sup>  
<sup>eniger</sup>

Feb. quart. intermit-  
tens

deinceps sed rarissime ex febre.  
Symptomata vero et signa apparen-  
tia singulos humoros peccantes ostendunt.

~~accidentia~~ Habit' hoc quartana a reliquis fe-  
paroxysms' faciunt. bribus durissim', quod in principio  
~~ploramus~~ accessionis, agri comedere cupiant,  
ob materiam in ventriculum pulsam.

Cur tardo reddant paroxysm' causa  
Est 1. quod humor sit admodum te-  
nax ac crassus. 2. quod omnes par-  
ties ut et cor sunt admodum consti-  
cta, multe eruditates in corpore  
abundent: quare non ita prompte  
expellunt humorone noxium. Date  
enim illis nino dicunt se melius ha-  
bere; reficiuntur enim spiritus ui-  
tales, quare cor se magis expandit.  
Febbris haec in Juuenibus non usque  
adeo periculosa est, at in senibus  
ob eruditates multas facile abit  
in hydropeum. Soluntur a. ferre cir-  
ca reparationem uernuum.

pulsus

pulsus parvus est propter contracti  
onem cordis.

Feb. quart infirm  
tens

Vrma sedimentum habet rubrum,  
si vero confirmata sit quartana,  
ingrum aliquando parva admodum  
quantitate reportatur; quod utram  
figuram est confirmatae melancholie.

Vrma quartana  
rjs sedimenta est  
rubro

Primo paroxysmo humoros in uenter  
triculo et intestinis aliquo leniente  
medicamento educendi sunt. 2. Ex  
hibendum fortius purgans ex confe  
ctione Hamoch et pulvere Comitis

qdg; ingris in  
fundo matula  
faustis.

de **WARWICK**. Unde si corporis  
sit plenitudo, aut magnus ardor,  
veneficio est instituenda. Vomitoria  
in hac febri non probare. Si his  
non cedat, fermentatio ad humoros  
attenuandos instituenda est ex chal  
bybis uncis duabus in circuifia  
maccrati vel in aqua pura per  
octo dies unde eger bibat matur  
duas uncias consumpto liquore,  
eadem chalybi aliis superinfunda  
tur; egerque hoc potu utatur.

Lanibus 1°  
mon fortiorib.  
medicamentis  
humor expungand.

quartanarii

Febres Composite quartanarum non sunt frequenter. Et  
nisi ex nullorum observatione.  
Oriuntur quartana satis ex crasso  
aeris quam ex crasso cibo.  
Raro accidit uomitus in accessus initio.

paroxysmus est  
hora. 29.

Prima multis diebus aquosa manet. ac  
cessio durat iuganti quatuor horas.  
Frequenter oriuntur ex maligna febre  
progressa.

Febres quintana, sextana &c. oriun-  
tur oriuntur ab humore melancho-  
lico crassiori.

vidi 330 febribus  
octana plenis  
paroxysmos in  
nobili comite  
ab Hartfelt  
anno 1650.

### Caput decimum

de

### Febris Compositis.

Febres composite Confusa febris non semper oriuntur  
ex commixtione duorum diversorum  
humorum sed sope ex humoribus  
inter mediae temperaturae.

continuae sunt  
vel  
intermittentes.

Connectuntur continua cum contin-  
uis ut duplex tertiana continua  
admodum frequens est. sope ron-  
ctuntur intermittentes.

Raro

Faro connectuntur quae sunt diversi Febris hepticae generis, ut quotidiana et tertiana, quia tertiana febris semper insipue generis est in uenire. Ego uno die uidi octo tertianas intermittentes: ac sequenti die iterum octo. subsequebantur autem se eodem die febre post duas horas finito semper sudore.

Discrimen est quod quartana febris eodem tempore et eodem modo inueniunt tertiana uero non.

Semitertiana signum pathognomonicum est quod sit continua et sope habeat rigores. Contingit autem rigor, uel quia ortus a ualde maligna materia uel ab infestatione partis alienius sensibilis ut parotidum, intestinorum, uel sit ab intermittentibus subintrantibus.

Reliquum quod dicunt febris totum imaginarium est.

In spissi felib  
rigor uel a mate  
ria malignata  
uel  
a partis sensibili  
inflammatione  
eritur.

## Caput undecimum

### de Febre heptica.

Febris heptica est calor prater  
naam

Heptica fuit

Febris hæctica.  
continua con-  
sumptio  
corpus emaciatur.

(35)

24

naturam in cordis substantia, primum  
ac per se horous et inflexus. Solus  
calor elementaris supra modum  
auctus febris hæctica est essentia.  
Hæctica febris pathognomonia cum sig-  
num est constituant haec tria. I.  
quod sit continuens. 2. quod exacerbetur  
duas fere horas post assumptum cibum.  
3. quod corpus vehementer consuma-  
tur.

Contumelia nascitur quod cordi con-  
tinenter aliquod molestum sit, ido-  
cumenter cor celestiorum perfumi  
dit. Id autem vel est in materia  
sanguinea; vel in loco extravasato.  
in massam sanguineam venit quod  
paullatim prono inter generis sit con-  
tractum, vel quod reliquie sunt  
alicius ardentes febris nondum e-  
micta quo sensum reliquum corrumpi-  
unt et cor molestant.

In loco extravasato; ut cum hu-  
mor aliquis putrefact in parte ibig;  
colligitur, ut crudum tuberculum in-

Vitioso se. humor  
in vel extra  
unus  
contento

polucre.

pulmone, vel quando ipsa pars patifit, <sup>Febbris hætica</sup>  
ut pulmo, infusæ, rinos, mesenterium  
etc. sed haec partes præcipue.

Exacerbationis post cibam causa  
est, vel quia cibus malam largitur  
qualitatem (quod potissimum in fin  
bacteris accedit cum ventriculus in  
cepit non bene coquere) vel quia  
cibus et potus particulas calidas  
existentes dissoluit, quae dissolutes ma  
gis cordi sunt molestæ. Partes autè  
haec sunt humor acidus et sal. Si cum  
oleum nitroli in manu continuas  
et parum aquæ affundas, non po  
teris pro ardore continuo. Et inde  
uno eos qui salso catarrho laborant  
si bibant in febrem incurere, quia  
materia potius dissoluntur: si non bibas  
imminues illum. Quare et recte  
Galenus calcem unam pro exemplo  
adduxit in qua partes calidae sunt  
sal.

Consumptiois denique causa est

consumptio

<sup>Corpus</sup> consumptio

continentia febris, unde humor est  
mepiti redundatur ad nutritionem,  
et ardor assidus omnia intus de-  
populat: Atque etiam facit coar-  
ctatio partium motum sanguinis ad  
se non admittentium.  
Si quare causam si humor in mas-  
sa sanguinea corruptus sit, fere  
equaliter affigit, nisi quod post  
ibum exacerbatur, et urina in-  
terdum exhibeat sedimentum (quod  
sopè in sanis nascitur ideo quod  
ventriculus male se habeat) inter-  
dum uero non processerunt causa  
autedictæ: ergo se febricitare non  
putab.

Et si materia extrauafata in cau-  
sa sit, ac proprie cor continentur  
afficiatur, tamen multæ contin-  
gent exacerbationes, ob prius nunc  
confertim, nunc parco, nunc raro  
nunc frequenter, ad cor a foco  
venient. Vnde interdum egri subito  
extinguntur.

dante

Febris letitia

Dantur autem tres rectiore gradus.  
 primi gradus signa iam dedimus et  
 liquis communia: secundi gradus  
 signa sunt pinguedo in urina et  
 manifesta consumptio; consumptio  
 autem omnium partium sumit a  
 principio fit, non scorsus hujus et  
 illius tertii gradus signa sunt ar-  
 dor in guttura, prostratus appetitus,  
 frequens lipothymia et facies hys-  
 percatica; consumptio totius quam  
 fieri peracta.

Judicium a hecticam curare  
 ualeamus haec tria potissimum de-  
 monstrant, quae si absunt, frustis  
 curandam suscipimus. 1. ardor  
 guttaris. 2. prostratus appetitus  
 et concoctio depravata. 3. frequens  
 lipothymia. Nec si absunt eius  
 curam sic ~~fusiformes~~ instituimus  
 1. purgamus. Inter corruptos hu-  
 mores. alio, piluleis ex alio,  
 et chalybae intricato.

Curablem cura  
 institutam  
 purgantibus  
 fermentatibus  
 et  
 aspergantibus.

seruando corrugamus humores fermentatione ut oleo sulphuris in tuoli, nitri. tertio refrigeramus si potest decocto presertim semper unius majoris.

Sequentia haec observauimus ergo in febri quodam pulsam scilicet naturalem horum matutinis tardum animadversi; forte quia materia tenuis è foco ad cor non mittebatur. Non estimamus facta in corde febri manu enim plerumque frigidi sunt, vel tunc etiam quando materia corrupta aliquo tempore non uenit a foco ad cor.

Nutritur solida pars quo tam bene ab initio consumitur quam aliud, quamvis magis resistat.

In febri tertio gradu pinguedo in urina fit, consumpta membrana interposita pinguedine et hoc modo exsiccata sanguinis prohibetur et consequenter nutritio, inde partus concidunt.

Venae non semper exhibent putredinem

durat hectica ad quatuor aut  
quinque mensos vel ad semiannum.  
Ego uidi ad nouem annos extendi.  
Si materia sit ne humore vel in  
parte extra uasa; aliquando ex  
acerbationes oriuntur ordine nici  
to.

non longo  
tempore  
durat.

### Caput duodecimum

#### febribus malignis.

Febris maligna  
nam

Febris maligna est est vel simpliciter talis, vel pestilens vel pestis.

Simpliciter maligna est que graviora symptoma quam que pro ratione cause, a qua existantur, habet. Pestilens que adhuc graviora: pestis que, gravissima. Adio ut tantum gradu

differant simpliciter maligna pestilens et pestis. Estque vel continua (que frequentissima) vel continua, vel intermitens. Symptoma illa graviora sunt in facultate (ut uocant) intali, que respiret vel uires cordis

significant

maxima cordis  
auictas et

facultatis  
intali

vel paucum

*Febre maligna*

dibilitas.

*Iam  
doloria, nigilia,  
convulsio[n]es et  
crebri uomitus.*

vel pulsuum, nam pulsus debiles est et  
intermittens. Frequentus accedit lipofly  
mata, quibus accedit cordis auxetas.  
Hoc sequentia sepe procedunt aut  
concurrentia: delirium, nigilia, con-  
vulsio et uomitus.

Virma coronam habet claram, me-  
diu[m] oleosum; in fundo sedimentum  
habet.

Delirium, convulsio, et palpitatione  
cordis sunt a materia tenue pen-  
trante, et spiritibus aliiu[m] motu[m]  
conciliante.

*Ideg; vel a mā  
tōni occulte vel  
manifeste sedente*

Causa horum symptomatum est vel  
occulta vel manifesta. Venena enim  
que agunt sua tenacitate et mobilita-  
te agere plerique uidentur sic  
etiam ex putredine propter resolu-  
tionem partium, et cum ueneno teneta  
tenet uenena orinuntur. Manifesta ut  
a tenacitate materia penetrante et  
spiritibus aliiu[m] motu[m] conciliante.  
Neque contra hoc ualeat argumentum  
quod hoc febris exortentur medica-  
mentis

occulta

occulta qualitate agentibus hoc est  
falsum est: agunt enim alexipharmacis  
manifestis qualitatibus, nam  
vel teminitate sua mouent sudores, et  
sic uenena ex corpore expellunt: vel  
crassitudo tenacia merassant, ut st  
cunia quo opium recipiunt.

Ab occulto etiam qualitate fieri  
apparet in carbunculo et carbone,  
in quibus est materia crassa. Ergo  
non a teminitate semper oritur.

Malignitas illa est vel calor vel  
acumonia.

Causa hanc producentes sunt vel  
internae vel externae.

Internae ut humores et spiritus.  
Externae vel sunt a simili vel a  
non simili: a simili ut a cada  
uero, ab alio infecto; idque vel  
mediata vel immediate.

A non simili, ut ab aere infecto  
qui a vaporiis subterraneis pravis  
et aqua putrida oritur.

Humores corrupti vel ustioni  
cuicis characterem exhibet carbunculus

*Febris Maligna*

Bubo, Petechia; uarioli et morbilli: vel putredine.

*Carbunculus*

item at

Carbunculus apparet pustula rubra in superficie maculam lundam habens, orturque hinc in omnibus partibus.

*Bubone*

Bubo in omnibus glandulis. In bubone non est tanta malignitas quam uulgo putatur. Petechiae sunt pustula nigra.

Lingua candida et quasi pollicula onorum, obducta; unde solum maligna febris admet cognoscitur. Sunt etiam motus convulsus, aliquando uomitus, diarrhoea: quando manus corpori applicantur aliquando tendo-nes contractantur.

Sudore definit  
equum modi febris

A febre maligna mala licet plures evadant, secus ac in peste, definit fore sudore ut in peste.

*Curatur vero  
restaurantibus*

Cura harum malignarum et praecipue pestilentium haec est: Vix bona nutritione sunt instaurandae, detinatur uimum temperatum, si febris

fit auctor

sit ardentior cum succo citri et  
saccharo. Causa tollatur sudoriferus  
ut theruaca a 31 ad 3ij. diafordin  
3ij et Lapidis biformis ad triginta  
vel triginta sex grana. purgatio et  
venae sectio non nisi in fumis lucet  
corpora etiam sunt cacozy nixos,  
locum halent.

Sudoriferus

3

burgos et nova  
Bodrum  
ad fumos.

Curatur carbunculus applicando  
vesicatoria, non ipsi sed parti membra  
et commodiori ne augatur.

Parvus applicat radices hellebori  
nigri. Vesica uno impetu rumpenda  
ad eum tandem magnum dolorem,  
quem agri vide ferunt. Ad lenior  
fum dolorem applicant butyrum  
cum oleo pilorum.

item uferuntur

### Caput decimum tertium de

Variolis et morbillis.

Variola sunt tubercula quoddam  
per totum corpus dispersa et super  
purantia.

Variola et  
morbilli

Morbilli sunt maculae instar pulic  
cum morsul

pulicium morbus utrisque genus tumor  
est.

Morbilli sunt ab humorc bilioso ra-  
rissime putrefacte, sed seco dissipatur,  
caro suppuraatur.

ab humoris quoque  
sunt sed  
principio a humoris  
et maligno

Pariola vero ab omni humorc sunt  
et quidem ab ipso seco. Reris vocan-  
tur Steen Pockienus

Afflentur autem partes exteriores, solent  
carum superficies; uno aliquando in-  
teriora.

Malignitas qua hic est, consistit in  
eleci materiae molle et tenuitate;  
et sic sepi exteriorum polluntur, at  
rufus sepi interiorum recidunt: sepi  
tamen tarde excent; sed ab occulta  
qualitate prouincia statuendum est.

Sanguine se. usto  
putrefacto et  
maligno

Causa igitur proxima est sanguis  
ustus, putrefactus uel in alteram  
naturam commutatus, cui conuncta  
est maligna qualitas pars autem  
massa sanguinosa per universum  
corpus ex arteriis diffusa efficit  
pariolas et morbillos.

causa

Causa autem sanguinem hoc modo  
mutantes sunt aeris peculiaria  
vitia. Non uidetur hoc a sanguine  
monstruo provenire quod vero pao  
ri fere omnes hoc morbo laborerit,  
causa est, quia eorum corpus est  
humidius, et humores magis disso  
lutos habent (eaque ob causam  
puerperae faciliter corripuntur)  
quare etiam est quare ob  
humidissimam causam externam ulter  
ius dissoluuntur et corruptuntur.  
que causa etiam est quod non nar  
sus et morbillis tantum, sed et  
reliqui morbi malignis facilius  
corripantur quam ~~etiam~~ adulti.  
Et aer problematicum decet, quod  
ut reliqui morbi epidemici, in  
aliquo loco gravauerit, cum  
circumiacentia loca libera sunt  
Si vero sanguinem monstruum  
horum causam ricorosum sumus;  
dicendum uenenum illud latuisse  
in parte, et eius uiru rotundam  
fuisse, postea vero ab aliqua  
audiente

a virtus  
aeris

autem Epidem  
icorum.

aliquo primo  
die adest febris  
postdiu fit  
continua.

evidente causa excitatum esse  
vel in principio adest febris, vel  
nulla adest, si adest in principio,  
febre intermitit, postero die fit con-  
tinua, sequentibus diebus fit con-  
tinua.

In pueris hoc familiare est quod  
sunt famelici ob materiam aerum  
incidentem in ventriculum. Vox  
rauca fit si materia in guttur in-  
cidit. Tussis secca adest quando ad  
pulmones aliquid materia perirent.  
Oculi scintillant, caput dolet, so-  
nus magnus obnuit.

duo citius erumpunt Morbilli que citius erumpunt  
ad molles. — eo melius. Fecrem communis  
erumpentibus variolis et morbil-  
lis, optimum signum est.

Vrmæ ssp. rubra, crassa, turbida  
cum vel sine sedimento.

Tactu, autem uideri possunt,  
explorandi sunt. Dnde maculae  
rubrae proueniunt que post in-  
tervallis dies in uerbo tuberculata

tuberula abeunt.

*Variola et morbilli.*

Cura hac est. Immimentibus variolis  
et morbillis sudorifera exhibenda  
ut decoctum ficiuum, Theraca, be-  
zoar, diafordinum : c.c. 31. cocta  
in aqua libra una et semissim ad  
libram unam.

*Cura antea  
immimenti  
sudorifera*

Si immuncat aut adsit (quod malum  
est) aliquis alii fluxus, a decocto  
ficiuum abstineendum.

*Alii ad  
alii fluxus*

Tertior est uene sectio quam pur-  
gatio: quando corpus purgatum  
est, sepe male habent. Gargaris-  
ma bonum est at apud Petrum  
Torostium. Ad guttulis ardore  
extinguendis damus decoctum hor-  
dei cum syrupo violaceo <sup>aut</sup> decocto  
plantaginis linctorum ex syrupovio-  
laceo et nucifaginibus pem. cydo-  
ni orum. Oculi praecaudentur cum  
cremore lactis et croco. Tuberula  
aperienda sunt, si materia est  
concreta.

*Guttulis arde-  
re extinguendis  
decocto hordei  
cura syrupo  
violaceo.*

Ad circunuers delendas praestantis-  
sum est decoctum psorum flancrum.

*circunuers  
de pisor. flancrum*

Febris petechialis

(49)  
Caput decimum quartum  
de

Febre petechiali.

Febris  
petechialis  
nigrit maculis  
immitibus

et

Curatur et

Cap. 13.

Febris petechialis ex maiori cor-  
ruptione et malignitate; cum ma-  
culis nigris luidisque.

Eae autem duplices sunt, vel cum  
aliquid nigrum per extremitates  
arteriarum propulsum maculam  
nigrum ostendit, vel nigrum illud  
nascentur ex gangrena partium:  
et cum macula se si ostendit hi  
Belgii dicunt pepercoren.

Cura eadem est ac in aliis fe-  
ribus malignis et pestilentialibus

Huc usque de feribus

1 6 5 1.

dil. oct.

Johannes Celsus.

De partium morbis.

C aput primum.

de

dolore

Capitis.

Dolor Capitis

Dolor est sensatio cum tristitia  
certi gradus.

H e p a thia in genere ergo est  
sensatio cum tristitia certi gra-  
dus in capitis partibus sensum  
habentibus.

fit uel

D i s p u t a n t hinc m u l t i i n q u o d o-  
l o r c o n s i s t a t : a l i i d i c u n t i n s e n s u ,  
a l i i u o l u n t e s t r i s t i t i a m q u a s e  
q u a t u r s e n s u m . q u a e q u a s t i o c u m  
i n s u b t i l i t a t i b u s f r a n o l i s t a n t u m  
s u b s i s t a t , u t m u t i s e m a i n e d e n d u  
o m i t t e n u s .

I n s i n g u l i s a u t e m s e n s i b u s d o l o r e m  
f i e r i p o s s e a f f i r m a t *Phalernus* I . d e-

*S y m p t o m a t u*

Symptomatum causis. pagina 326.

Causa huius doloris proxima non est  
seu continuo solutio ut habet Mas-  
salias de dolore capitis pag. 22. cap.

2. dictumque solutionem dupliciter  
considerari uno modo ut a propriis  
sit causis: ut quo pungunt, diuellunt,  
corredunt. altero ut ex magna et  
vicienta altitudo spiratione, ac potissimum

calda et frigida. Si tamen medie-

vel ab  
velimur considerare, etiam inter  
tempore possat dici causa doloris se-

calda et frigida.

Pungunt humores omnis generis  
cum almentarii tum excrementi  
et vapores, si per eos levior hu-  
moris pars intelligatur.

Diuellunt humores omnis generis  
sua copia, sed semper fere serosus,  
vel flatus omnis generis. fero  
pituitosus quod frequentior in  
hydropicis fit. Addunt uenenos  
quidem raro. Narrat tamen ex  
enoplum

solutionem  
continuus

facta a rebus

pungentib. diuellentib.  
b. corrodentib. ab  
humorib. uermib.  
calorib.

Exemplum quoddam Hollerius libro  
I de Capitis dolore Cap. I.

Sicut calculi quam rariissimi: quale  
exemplum uidi Ego Parisii.

Humores illi continuum dissoluentes  
uel intra vel extra caput genera-  
tur.

*et obstrutiones*  
In capite uel obstructione, uel  
intempore uel soluta unitate.  
Obstructio fit et sanguis sic Cir-  
cularis non potest; ac proinde ma-  
teria illuc affluens colligitur, ut  
uidemus si nobis ambulantibus pilos  
capiti admodum fuerit impactus,  
statim cephalalgiam oriri: eo quod  
ob compressionem, carotidum exter-  
narum sanguis circulatio non po-  
test, quare via oculis ibi re-  
stagnat.

Ab intempore fit capitis dolor: quia  
sanguis ad partem affluens, ob par-  
tis intemporem non mutatur, dege-  
neratque; quare in partis nutri-  
mentum non facessit, ac proinde  
qualitate?

qualitatem aliquam ibi nactus  
contumaciam soluit vel dissolendo  
vel pungendo. Ob solutam unitatem  
sit, quia sanguis qui per eas partes  
circulare solet, distillat ubi ad  
partis marginem pervenit. Unde  
ex collecta materia tumor ori-  
tur. Quale exemplum vidi ego  
in quadam cui ex illa materia  
circa collum tumor microscorūt:  
qua evanescata dolor desmodat, do-  
not tumor redire.

Dolor hic differt ratione loci. do-  
lor enim vel externus, vel inter-  
nus vel universales per totum ca-  
psul est, vel particularis per eius  
unam aliquam partem et dicitur  
Proceris invixivid. Si autem exis-  
tuam partem afficit dicitur Clavis,  
cūm, pro uaria magnitudine partis  
dolentis.

Hemicrania oritur cum causa

ab iure

Dolor a differt  
ratio loci finalis  
vel se  
vel particularis

(24)

ab uno tantum latere existit, quo  
fit quando una carotidum tantum  
est obstructa, vel una materia  
fundit: vel ab uno latere conti-  
nuitas soluitur: si vero ab utro-  
que latere Cephalalgia in  
genere dicitur.

Clavis sortitur ob easdem causas  
ac hemigranum sed potissimum ob  
humorem concretum, et extra-  
vasatum in aliqua parte.

Ratione temporis est vel recens  
ut cephalalgia in specie, vel  
ininteratus ut cephalaea qua  
periculosa est, cum tamen dol-  
or capitis non sit admodum pe-  
riculosa, nisi adeo sit magnus ut  
vigilias inducat, et vires absunt:  
vel si sine fibri accedit tenebris  
cosa vertigo, tarditas uocis et  
manuum stupor: Et tum vel  
apoplexiā vel epilepsiam vel  
*Citharicum*

Ratione uero  
temporis  
decens vel  
ininteratus.

lethargum oportet expectare, unde  
ut habet Hippocrates libro &  
aphorismo si. Quibus sanis dolores  
subito sunt in capite; si subito  
obmutescunt et stertant intra se/  
ptem dies moriuntur. Quod sape  
euerit ut ait Horvinius ex libe/  
ratori potu, cuiusmodi exemplum  
in Juvene quedam poculis dedito  
observatum fuit.

Solutur pluviaque syfi, aliquan/  
do abscessu, raro crisi.

Cura pruis toti corpori est pro/  
spiciendum et demenda est causa  
peccans, deinde purgandina est  
medicamentis fortioribus; postea  
humores sunt preparandi. Si vero  
magna pulsatio et urtemens ca/  
lor adsit, uena est secunda  
commodissime accidit in brachio;  
sed tamen alio loco etiam iusti/  
fice licet. His factis capiti

Cura uero  
max ablatione  
purgatione  
uinculatione

prospiciendum

symptomati solent  
adversari per audiencia  
et custos resane ag.  
Urbano rite ratiore con/  
stituta. Vagi. alabathei  
num tutius applicar

prospiciendum est. Masticatoris optime materia educitur: Ex hinc raro proficiuntur: Sternutatoria locum non habent si illis non succedit. Cucurbitulas admoventur collo et scapulis. Si tunc adhuc sit magnus calor secundum uenam ingulariem, vel arteriam temporalem. Si in autem ab humore fugido oratur; post adhibita mastatoria et alia antedicta, cefalacumus partes potentissime, cephalicas calidissimis; inter quae puluis coryophyllorum et collis.

Quidam ad tropicum ueniunt, sed illud non est facile mitandum.

*Spectando utriusq. Si dolor perseveret spectare oportet ad partem quo nittit: Inter omnes autem partes uterius est frequentissime in causa*

Cap. 2.

Cucurbitulas  
item

Cefalacumus  
queque  
Si fugido existit  
affectione.

*Spectando utriusq.*

## Caput Secundum

de

principis facultatis symptomatis. scilicet  
de deliriis, cum et sine febre.

Delirium est quando homines uel male apprehendunt (nec solum per propostere (ut uult Faziolius, de prauata apprehensio ratiocinatur) uel fingunt, uel estimant.

Apprehensio mala sit uel quando obiectum male affectum, uel recte oblatum male apprehenditur. Exempli res illustratur. 1<sup>us</sup> quando quis uitio uiedii exterum ut diuin per uitum cœruleum quis uidet, omnia confundit cœrulea. Posterioris exemplum in biliosis obviuum est, qui cum distincte loquuntur, utrumque in tarditate committere se arbitrantur, id que diuin cœndare student in balbutionem

balbutio me currunt. Ratio est; quia obiectum ipsis ut tale oblatum est, male tamen propter maiorem in illis (contra ac in pituitosis evant) spiritum agitacionem apprehenditur.

Obiecta nobis offeruntur per species. Specierum autem mutatione fit intermedia via, medium uero non est extra cerebrum: nisi quod ut in ictericis, oculus alieno colore est imbutus) sed in cerebro.

mutantur uero ob  
uapores et fuligines

Medium autem per quod obiecta fermentur, nullum aliud dari potest nisi spiritus. Immuntantur autem spiritus uel per humoros, uel per vapores seu fuligines que ipsis permiscentur, speciesque alterant. Hoc in melancholicis luce clarior apparet, qui ea que aliquantulum in grā sunt prorsus nigra iudicant. Species uero ita mutantur non per ueram mutationem sed speciei mo<sup>nō</sup> difactionem. ~~non~~ mutari species

exempli

example probatur: si e. quis in cubiculo, per digitum summitatem omnes species, quae in eo ab obiectis fluunt, recipiat: quanvis omnes ibi proterfluant, nullam tamen accipient mutationem, quare per modificatiōnē fieri necesse est.

M alē itaque apprehendimus uel uitio cœubri recipiuntis ob eius constitutionem uel melancholicam uel pituitosam, uel biliosam. Si e. cœrum simili qualitate ac id quod offertur affectum est, eius iniquum iudicabit excessum. ut, si quis manū fugitām igni obtulerit; ignem non adeo calidū iudicabit, ac ille qui calidam ei admonet; ob similitudinem recipiens et rei recepta.

Fictio mala sit quando disiungenda conjunguntur, aut contra fit autem id uel ratione speciei uel Fictio  
disiungenda  
et ē. continet.

delirium.

ratione facultatis ob species si  
sunt vel nimis intensa vel nimis  
debiles. Intensa sunt vel si sunt  
nimis illustres, vel noue; vel  
cum animi affectu apprehensae,  
vel sepius cogitatae. Vitio facul-  
tatis ut cum spiritus inordinatio  
moventur quod fit ob humoros  
idiosyncrasias eos agitantes, ali-  
aque causas eos <sup>turbantibus</sup> inquietantes. Ita  
ut nunc in hanc, nunc in illam  
speciem tendant, quod a cerebro  
regi non possint. Ut apparet in  
cbris, qui pronoscere omnia  
proficiunt, et que minime cohe-  
rent. Estimatio mala fit eadem  
ratione ac apprehensio.

Caput tertium.

de

phrenitide.

Primo sic agendum nobis

uxit

(61)  
ment de deliriis cum febre. Phrenitis.  
que sunt phrenitis et paraphre-  
nitis.

Phrenitis est delirium cum febre. Phrenitis  
ubi aegri continuo cogitant loquun- delirium est  
tur et omnia agunt cum furore cum febre  
aut iracundia.

Phrenitis continua est; quia facta a continuo  
sanguis ita est constitutus, ut sanguinis fluxu  
continuo cerebrum spiritusque  
agitet. vel quia materia hareret  
in cerebro, ob aliquam obstru- Vnde  
ctionem, vel quia est inflammatio  
aut erysipelas meningum  
quod raro contingit, ut in pro-  
quenti phreneticorum dissectione  
apparet; sanguis autem sit a  
sanguine corrupto simulque  
fibrum synochiam aut continua  
(in eum exacerbationibus deli-  
rium quoque inuisit) innubatur

Cerebri inflammatio

dandi?

deinde etiam a materia biliosa et  
putrida salsa fit.

phrenitis quod differentiae sumuntur perpetuo a  
magna est vel magnitudine et quantitate affe-  
ctus, et prout humores intus se-  
sc habent, eo mitior erit phreni-  
tis: quandoque cum resu ut ait  
Hippocrates, & aphorismorum 53.  
minus periculosest delirium  
quod cum studio minus tutum.

2. alia est in habitu alia in  
dispositione. 3. ex lesionē opera-  
tionum principiū. 4. a loco  
affecto. 5. alia exquisita, alia  
non. 6. a tempore. 7. a causis  
que sunt vel interne vel exter-  
ne.

Euentus. phrenitis magnis mor-  
bus est, et interdum 2. 3. vel  
etiam 7. diebus terminatur. Si in  
uero in lethargum uertatur  
non bonum est. Galen. Coment.

in libriue

Cetera tumen ma-  
gnum malum est

in lib. 6. epidemior. cap. 6. et Phrenitis  
 si uires prostratae sunt concla-  
 uatum est, uel si m. hectica  
 degeneret.

Signum pathognomonicum est <sup>Cognoscitur a-</sup>  
delirium continuum est alter <sup>en delirio continuo</sup>  
 rum quod quamvis non soli sensu febri acuta:  
 per tamen ad sit febris continua,  
 acuta: que duo sola signa ad  
 diognosendam phrenitidem sufficiunt.

quod si preterea uolumus addere <sup>Juncta simul</sup>  
 difficultes somnos, uigilias, fitim in- <sup>insensibilitas</sup>  
 signum si quo sepe non persistunt <sup>Postius summa</sup>  
 tamen, et aliud id genus simila- <sup>indumentia</sup>  
 mata, quo certiorum Morbi cogni-  
 tionem habebimus.

Cura: iunctus ratione, auertentibus <sup>Curatur</sup>  
 repellentibus, intemperie calida <sup>aut raro repellit</sup>  
 et marina per quas ascendit ma <sup>tib. refrigerantib.</sup>  
 teria laxitatem corrugentibus, <sup>Laxantib. et</sup>  
 digerentibus materia, synpto

mata

Delirium simplex

(67).

39

symptomata corrigendo, quae maxi-  
ma hic sunt insomnia et schizuria.

### Caput 4.

de

#### delirio simplici.

Delirium  
simplex

Deliria sine febre sunt quadruplicia. Delirium simplex, nihil alio ha-  
bita, mania, et hydrophobia.

est mala specie  
receptio

In delirio simplici non immunitur species, nisi admodum raro,  
ut in vertigine apparet: que et  
delirii species est: sed male re-  
cipiuntur. Hoc autem contingit  
ob cerebri debilitatem; quod  
cum antea spiritus regeret: spi-  
ritus cum uario agitantur (ua-  
turaliter cum a facultate cere-  
bri pro libitu voluntatis ad has  
uel illas species promendas impel-  
lantur), vel ex aliqua causa  
dissipati aut commoti sunt (ut a

contagione)

contusione, ictie, lassitudine, vigiliis, Melancholia  
 nimia sanguinis evacuatione, hanc  
 uel illam speciem ad quam se-  
 runtur, illustrant. Vnde mens  
 eo tempore delirat, qua causa  
 est eur senes multa insulta  
 proferant. Delirium facile cu-  
 ratur nisi in sombus ob nimiam  
 debilitatem; et opus est tantum  
 spiritus instaurare, ut conserua  
 anthos, zosis, lauendula, salvia,  
 aqua uitæ, uertici applicata  
 prostantissimum remedium est  
 etiam ipsis sombus.

Curati uero  
 spiritus  
 instaurantib⁹.

### Caput - g - tum.

De

## Melancholia

Melancholia est delirium sine  
 febre, non quod semper ea carerat, Melancholia  
 sed quod placidumque sine febre adest, placidum;  
felix caput est felix caput est  
 et platinum

cum metu.

Melancholia.  
a. cum motu et  
moeſtitia.

cum motu et moeſtitia quo duo  
tamen non ſemper adſunt, ut in  
eius mitio apparet, ſed ob teſ  
ſequentes cauſas facile mitis et  
moeſtitia ſuperueniunt quibus et digne  
ſeatur. 1. aut magis mente augui  
tur aut q[uod] magis facit quam fo  
lent. 2. quequid occurrit grauitate  
ponderant, et que leua ſunt gra  
uita aſtinent. 3. ualde ſunt suffi  
ſa spiritibus obſcuris et omnia in peiorum partem  
ſupratim et ſpo  
cubus ita propria  
zophii  
caces et omnia in peiorum partem  
interpretantur. Quod autem me  
tus et moeſtitia adſit, uidetur  
eſto ob spiritus obfuscatos et mi  
griores factos; qui ut bona conſti  
tutione luciditate vel ſplendorum  
imo et gaudium offereant, ita et  
hi contrarium faciunt.  
Primo in melancholia immutant  
ſpecies (quod non euent in delici  
o ſimplici) a spiritibus proter  
naturali qualitate affectis per  
fuligines

fuligines ex arteriis in cerebrum  
propulsas, ob quas species magis  
obscurantur, vel nigriores redduntur,  
vel magis agitantur ob motum  
fuligineum.

Secundo melancholia contingit non  
ob specierum mutationem sed ma-  
gnam impressionem, quod bifurcum  
contingit: vel quia sapientia cogita-  
ta, vel quia cum affectu appre-  
hensa, quod prototypus contingit in  
terrore, et magna animi intentione.  
Et his affectus suasione potest  
curari: quia in his utroque corporis  
constitutio non aderit. Vnde de  
arteriis bene loquuntur. 2<sup>a</sup> ratio  
est in receptione quia spiritus  
regi nequerunt, non ob cerebri  
debilitatem, (ut in delirio simplici)  
sed ob minorem spirituum agitationem  
qua sit dupliciti modo: vel quia  
agiliores redduntur a fulgimibus

Vol. a  
subita et magna  
impressione  
ab affectu  
vel et  
nouitate.

Melancholia.

ius motum conciliantibus; vel quia  
fates naturā suā existunt.

Spiritus autem ex crassis redundatur  
quando sanguis non bene concoquitur,  
fermentatur, aut rarefcit. Nec hoc  
tantum sufficit, ut sanguis sit crassus  
sed et dissolutus esse debet, ut tenacia  
a crassis facile segregentur, quod  
contingit ex uitio ventriculi, he-  
patis, Lienis et præcipuo cordis.

Humor hic cum dissolui incipit,  
accidit palpitatio in hypochondriis.  
Iquod uero de ardore et dolore hic  
adferunt, Imaginariū est potius;  
rarissime enim adserunt, saltum  
dolor: uerum tensio quidem.

Quæstio autem hic erit an et  
melancholia hic possit excitari a  
dæmons, et statutæ Thesis affir-  
mativa. Mass. b.d.

Differentiae sumuntur ab actionibus  
lœsis, 2. à magnitudine et parui-  
tate. 3. (quod præcipuum) a loco  
effectu.

IItem

a Dæmons.

Varijs,

affecto. Hoc cum materia si horcat  
in uno loco ut in liceo et hypocon-  
driis dicitur melancholia hypocon-  
driaca. Si in uasis liberis, pri-  
maria.

Euentus. Morbus est pertinax et  
curatu difficultis. raro moriuntur  
nisi in histicam degeneret. Si in  
uero adsit Zelophysia ab omni ar-  
morum usu debent abstineri, cu-  
ius Eugenidum narrat exemplum  
narrat Horinius ad aphor. 23.

sectionis 6. nec etiam Læthalis est  
nisi in aliud morbum transmutetur  
ut epilepsiam, apoplexiā, cœcta-  
tem. Hipp. aphor. 26. sect. 6.

Ut autem in eiusmodi casu recte  
predicamus; opus est ut in hemic-  
teau morbo, robur agrotantis nec-  
non infumentari et multitudinem  
symptomatum annaducatur.

Malum quidem  
pertinax

Si aliquis

si aliquis enim morbus est qui  
egat prudenter medici, unus san-  
hic conscri debet.

*Cura*. Cura primo purgamus medicamen-  
tis medio cibis; postea largior  
purgatione et  
Larga phlebotomia.

est secunda uena. preparamus cura  
nitro, spiritu nitri. Si calor adit,  
infusione chalybis: si fugus cum  
vino, aqua cinamomi et similibus;  
si nihil hac ratione effectur  
purgatio coimoda est. Si hac  
non cedit, vomitoria sunt adhibenda  
ut gutta gantioia, Fallopia, iureu-  
rins uitæ, vel similia. plurimum  
prodest caure ab animi affectu  
nimis, in unaque eius intusione

et molculari ha differt mania  
quibusdam tantum accidentibus et  
gradibus (maniae cum sunt te-  
mori, iracundi, crudelis; melan-  
cholici autem tundi et maesti

et in se

Si melancholia valet  
est, fundi carnis, victus  
se. humorata, proponit  
Si Corpus dolens, si  
Invenimus hydropathia.  
Si rurifica nulla lumen  
Si morbus est hæreditaria  
Somnum conciliamus  
Balneo ag. dulcis aqua  
pura. Tandem rur  
albrosis, hædoribus et  
recharchis farzulis, clavis  
propiet. Cap. leporum.  
Cuncta omnia attrahimus,  
et humoribus ag. vel syr-  
pum. redolent. tartaro  
Vitis late. 2 purgationes p-  
int. hædor. Capit rebribus  
Si ab Corpore et hædor  
Vomificatione restringitur non  
caput humeri. Vom. humeri  
et caput. Potundit ante  
dicto. Cib. dum a syrum  
Si ab utro libet aliis.  
Si est melancholia exanimis  
repellitis Vomitione danda  
enim obsecra nos leporidem  
ag. brach. Autem. Sordor  
fumus ab aliis. Hædor. Spas-  
modicus Hartmannus.  
aq. fragorum

et in se inicem facile transmutantur, *Hydrophobia*  
 adeo ut qui hodie molantholicus  
 eras manatus oret et nunc ursa.

### Caput 6<sup>um</sup>

De

### Hydrophobia

*Hydrophobia* est quando aiger  
 omnia liquida metuit. immo non  
 patitur ea uominari. Causa.  
 Sit bifariam hydrophobia vel ob  
 speciem illustrem; vel ob morbum  
 canis, felis, simiae, hominis item  
 et equi ualde irati. &c

Causa etc. hoc faciunt modiante  
 salina, qua vel din vestibus  
 adhaeret, vel nudam partem tan-  
 git. Verum enim uero omnis salina  
 canis hoc non facit, sed vel ras-  
 bio si vel ualde irati, vel eius  
 qui sub lingua

Aqua metas  
 contingit ut  
 plurimum  
 morbo canis rabidi  
 mediante salina

Hydrophobia

qui sub lingua inflammationem habet  
et urinet; nol etiam sine urino  
ut obsecratum est.

*Salina vero  
haec sanguinem  
coagulat*

Quomodo autem esse tali salina  
hydrophobia nascatur, dictu im =  
primis difficile est: Si tamen in =  
re difficulti aliquid divinare licet  
uidetur id contingere propter salina  
mobilitatem et penetrabilitatem  
at quo coagulandi uim, quo sanguis  
in per circulationem communicata  
cum instar coaguli incrascat; unde  
statim sequitur melancholia; donde

*temuore partem san  
guinis in gulan  
incidenti et mole  
tram patiente* manu et postea hydrophobia.  
Hec uero salina dum sanguinem  
ita coagulat, segregat partes  
temuiores a crassis. Temuor autem  
ille humor facile suscipitur et  
imbibitur a gula, propter partium  
circumiacientium spongiositatem;  
unde aliquam

hunc aliquam mæstitiam et mole-  
stiam ægri hic percipiunt, quam  
ad eo magnam faciunt, ut omnes  
molantholici qui minima mala  
maxime dicunt, ut se deglutire  
non posse arbitrentur, quare iis  
quæ assumere debent aduersantur  
ut sunt omnia liquida.

Et quod confirmandum valet  
quod nidi et obsecrari: inter-  
rogavi e. Hydrophobicum quid  
causæ esset quod minime bibe-  
ret, tandem ægre respondit cau-  
sam in gula e. s. fuscum. In  
dictio materiali ibi collectâne  
mæstitione parere, quam magna  
ad eo faciunt ut nulla suasione  
humida assumere velint. Tenu-  
em a materia gula multam  
molestrans

Hydrocephalia.

Utrum suffocatione  
&c.

(74)

molestiam parere apparet in  
uteri suffocatione, catarho, se-  
brie pestilentiali etc.

Primum haud  
naturam huius morbi

Euentus. Morbus magnus est  
et mortalissimi maturi et  
succurratur cunctaque homines  
fere quadraginta diebus sibi  
tamen qui per quinque mensos  
et laborant, quod raro  
indicia quibus canes rabidos  
cognoscuntur, sunt. sumunt  
habent in ore & toro in  
fuerit. canis, alijs gerunt  
& non latrant. et canis  
oblotum fastidiant, canis ob-  
noscit, quosque inde deinde sentiunt.  
deinde attant, an canis fuit  
rabidus hoc modo vox velut  
fiet manifestum. si canis nullus  
nisi applicatus et alterius  
canis non possit canere.

cani obsecatur, non comedet.  
si tamen contingat, intra bidū  
aut tridū morietur.

Cura consistit in præcau-  
tione et viruſe ulcione in  
Corpus corporal. quæ le-  
guntur sub fine affectionis  
et Cor vel S. frustis. 2.  
Cucurbita cum flammagē  
bulverata applicata una  
cum scarificatione si bulvera  
est exangue. Catchache et  
medio manu repugnativa  
vel Caudice rotulosa  
prægnante lollibore. sed marinam si fieri potest, sic o-  
rari plemento mixta  
simplici.

Cura magis experientia pro-  
batur quam ratione; micetio  
se licet improvisa in aquam  
marinam si fieri potest, sic o-  
rare personatur. Si à spuma  
orta sit, locus abluitur spir-  
itu nini. Si a morsu cœcur  
bitula cum scarificatione ap-  
ponenda sunt cum magna flam-  
ma, aut etiam uiscatoria ut  
venenum extrahatur.

Vulnus non claudatur ante  
tres menses sicut apertum ten-  
atur mercurio et gentiana.

Si post 40 dies aeger non  
im peius labatur, tractandus  
ut melancholicus aut maniacus.

Curatur  
sabita  
et impruneta in mari  
infectione

Cucurbita item  
et  
Lotione ex spiri nini

Dofuit alijs

Sopor.

desunt aliquando paroxysmus et  
molam holicam  
aliquo rursum sed non hydrophobia  
sed molancholia vel convulsio non  
in Convulsionem. tamen statim periodis.

Caput septimum  
de  
Sopores affectibus in genere et  
in specie.

Sopor si

Si reut abolitae functiones sunt  
stultitia et amentia sive immu-  
nitate sunt soporosi affectus.

2. a parte  
extinto se calido  
innato id est hispaniam  
immunitione se op-  
promissione et corrupti-  
tione

Sopor nihil aliud est quam somnus  
gravis: et different immunitate  
potentia certi gradus sensus co-  
muni functionem bene obrundi.

Causa uitium est vel in parte  
vel in specie. In parte quando  
calidum innatum ex parte sativ-  
etum est sine immunatum. Si

*Sopor.*  
Si enim ex toto apoplexia oritur  
et mors succedit.

Calidum initium minuitum  
est 1. quia dissipatum, quod ui-  
demus post febres ardentes. 2.  
quia obtutum. 3. quando corrus-  
ptum ut mortuus aspidis, ut ut  
narcoticas variis. In specie  
nitum est 1. quando non sunt  
quod contingit si carnae impres-  
siones ob humiditatem nimia  
euamere ut in obliuione. 2.  
quando species non commode fe-  
rit imaginationem, quod fit vel  
ob defectum spiritum vel coru  
ineptitudinem.

Spiritus deficiunt 1. si sunt con-  
sumpti ob nimias uigiles, mo-  
tum, aut intensissimum dolorem.

2. quia

Sopor.

(78)

2. quia non generantur. 3. quia  
non pervenient ad illa loca ubi  
species illustrarent, idque vel  
ob obstructionem vasorum seu  
meatuum cerebri ex parte (si  
enim est toto, apoplexia oritur)  
vel contusionem, easum, ob com-  
pressionem et ligaturam caroli-  
dum arteriarum. 4. quando  
spiritus alio uergunt ut in fe-  
bre liparia.

Spiritus sunt inopti ad illusta-  
tioneum posterium, dum minis  
sunt crassi, quod sit, vel cum  
iis aliquid permiscetur ut napo-  
res crassi, copiosi omnis generis,  
elevati a ueribus, seruine men-  
struo corrupto, circa uterum,

ut et cetera --

ut et cœnus, uno, sumo car-  
bonum aliquaque robus extensis.

Lethargus

Denique spiritus non commode  
ferunt imaginationem, dum  
merassantur et sustentur quasi  
a narcotio.

Sopor aliis grauis est qui  
et cataphora grauis qui et  
coma; grauissimus qui et carus  
diatur, qui gradus tantum sunt.

Estp sopor  
alius Loris aliis  
gravis aliis  
grauiissimus.

Sopor differt ab apoplexia rati  
admixti. sopor enim aliis est  
cum febre, ut Lethargus, aliis  
cum uigilia, ut coma uigil.

### Caput octauum

De  
Lethargo et comate uigili.

Lethargus s[ic] lethargia est  
fugida

Lethargus

Lethargus  
febre  
ante sua post  
febris

(80)

47

fugida et humida cerebri intemperies a pituita fugidiore et humidiori cerebrum madfaciente, febrem lentam, obliuionem, et inexpugnabilem pene dormiendo necessitatem induens.

In Lethargo notandum est quod sepor (sed raro admodum) prior heminem inuidat quam febris; frequentissime autem sepor febri sequitur.

Causa sepor febrem precedit si materia extra vel intra uosa in cerebro huius, non tantum seporum facit, sed et putredine a cris reddit et ad eor circulacione uenientis febrem excitat: qua materia potest esse omnis gentris: sequitur febris, cum materia febrilis magis attenuata

alius est  
nervus

e. iudeo?

(8)

e corde propellitur per arterias  
in caput, ibique excedit.  
Differentiae sunt plures: alius  
est nervus qui fit primario affe-  
ctu cerebro; alius non nervus  
per consensum: alius magnus  
alius parvus: desumuntur et ex  
varietate coloris: a modo gene-  
rationis. alius primo generatur,  
alius alios morbos sequitur, et  
principue phrenitatem quod con-  
tingit docente Galeno dupli-  
cationem. I. dissolutis partibus  
temperibus et calidioribus, unde  
crassiores et frigidiores rema-  
nent. Altera propter importu-  
nare stuporoscentium medicina-  
mentorum administrationem,  
unde cerebrum in contraria

Coma Vigil  
alius  
per consensum  
alius magnus  
alius parvus  
alios primarios  
alios secundarios  
alius alteros morbos  
sequitur et prae-  
pud phrenitatem.

Coma Vigil. utrum deducitur. xivua dicitur  
 Veterus f. Coma marcor. Veterus est deficiens et  
 imbecillus motis facultatis  
 imaginatricis a frigido et humi-  
 do magnam somni cupiditatem.  
 alius est somnolentus inducens. apud Hippocratem du-  
 plex eius differentia legitur,  
 unum somnulentum alterum  
 insomni; medici dyspepsorum regula  
 h.e. vigilantem soporem appellaverunt: hoc phreneticis, illud le-  
 thargicis proprium. Somnulentum  
 dicitur in quo oegri diuturno et  
 profundo somno permaneant. Inso-  
 nne in quo oegri vigilantes  
 manent clausis tamen fore sensi-  
 oculis nisi excentur, tunc enim  
 oculos attollunt et tangentem e-  
 respirant, libereque tum sentunt  
 tum insonber

(83)

tum mouentur; atque etiam desip- Coma Vigil  
iunt quod ipsis variis rerum ima-  
gines obueruentur; quo<sup>e</sup> illorum  
mouentem mouent. et somnia abru-  
punt. Corroens in definitionib. me-  
dic. 354.

Causa contingit autem coma  
vigil quando causa vigiliam et  
soporem inducentes adiungit quod  
bifariam contingit. 1. quando  
materna repleta calida sibilat  
acris est, quod frequenter in sy-  
nocho accidit. 2. quando spiri-  
tus deficiunt et tamen fulgi-  
nes quedam et vapores cor uel-  
licitant, unde febris ortur.  
Signa causar. Si a consumpti-  
one; totum corpus lassum est  
et tarde ad se redirent si a

*Hic contingit  
a copia vaporum  
uinorum.*

*Iste vero a perinde  
figidiore et humi-  
diori.*

*narcotico*

Coma Vigil.

narcoticis, reliqua signa absunt  
et pedes hinc atque illuc nascillant.  
Si a repletione sanguinis aut bi-  
lis; suis signis cognoscatur, et fa-  
cile, breviisque malum discutitur:  
cum autem ad se redeant, mate-  
riam illam expuendo per os et  
palatum evacuant.

Lethargus pri-  
mo a narot

Centus. Magnus et periculosis  
morbus est lethargus quia cor  
et cerebrum afficitur, et in si-  
nibus non curatur.

Coma mrd prie-  
relosum adeo o-  
est.

Coma vigil periculosa adeo  
morbus non est. Si copia ad-  
sit calidi humoris uena secunda.  
Si materia sit ualde pituitosa, ual-  
de purgativa colocynthide, dia-  
gradio, diaphemico.

Cap. 9. de Catalepsi.

catalepsis

Catalepsis est subita quadam detensio cum corporis tunc animi, in qua egris eam corporis figuram servant quam habebant quo tempore corrupti sunt; motumque et sensum in toto corpore amittunt sensus autem semper abesse patet ex Galeno qui eius narrat historiam elongationem de Adolescenti quodam.

Mattaras 86. pag. Etius autem huiusmodi omnem motum auferri negat.

Cause igitur vel ob locam imaginacionem vel uitium instrumentorum. Ob Imaginacionem locam contingit saepe in melancholicis qui sibi imaginantur. Locam Imaginacionem ut in molam holoris videre est.

Sic ita

*Catalepsis.* sese ita debet mouere.  
 vel lasum organum a spiritu  
 bus per obstructio-  
 nem retrocedere  
 nequeruntibus vel  
 a narcoticis in-  
 trassantibus.

Vitium in organo est, vel quan-  
 do spiritus admodum conforti-  
 sunt in organis, nec retrocedere  
 possunt ob obstructionem vel  
 compressionem, quibus hoc modo  
 dispositis spiritus tensionem faciunt.

2 quando spiritus crassiores red-  
 duntur et fistuntur a narcoticis.  
 Signa huius affectus sunt mani  
 festissima: Agri toti rigidi et  
 immobiles sunt, sensusque debiles  
 et stupidos habent; pratece in  
 eadem situ permanent in quo e-  
 rant quando corruperantur; adeo  
 ut imperti existimant eos altio-  
 rebus cogitationibus esse occu-  
 patos.

*Euentus* morbus sicut rarissimus

Morbus rarissi-  
 mus et oratifi-  
 mus est.

ita et

ita et acutissimus est, ac praei Vertigo  
pue in sambus; adeo ut nol mul-  
tam nol difficultatem curacione  
recipiat.

Cura eadem qua m Epilepsia Curatur  
et antiepileptica profunt qua  
fere deglutiri non possunt. antiepilepticis.

## Caput 10.

de

Motuum sensuumque symptomatis  
De vertigine

Vertigo est delitium quo Vertigo  
omnia in gyrum circumagi indeut.  
est autem delitium in apprehensione  
ob medium per quod species mali  
apprehenduntur

Cause medium hoc spiritus sunt  
qui in orbem rotantur, quare  
et spiritus a circumactio  
spiritum.

Vertigo.

et species in orbem rotari vidou-  
tare: quod uero spiritus sit in  
ceresbro potius in orbem quam sur-  
sum et dorsum agantur, causa  
est angustia mentium eius ob  
quam angustiam cum spiritus  
quaquam sum fluere ne queant re-  
flectuntur et in orbem mouentur.  
Quod sit a propria  
illorū levitatis  
vel a cerebri ins-  
tutio spirituum vel alieno spiritus  
debilitate vel  
a tenore. cum cause sunt si nimis sunt te-  
nuis, e aliis, mobiles: unde inge-  
mosi facile ob nimam animi  
intensioem vertigine corrumpuntur.  
Vitio alieno 1. quando spiritus  
a cerebro non reguntur et ut  
debetant, mouentur: quod fit ob  
cerebri debilitatem: unde sene  
hinc mors

huic morbo frequenter obnoxii sunt, Vertigo.  
 quia natura sua debile cerebrum  
 habent: deinde etiam cerebrum  
 debile redditur ob periculi terro-  
 rem; ob terrorem cum partes  
 constringuntur; ob constrictione  
 spiritus qui ipsas refocillat non  
 ita recipiuntur; unde debilitantur  
 partes quae spiritus non bene  
 reguntur. Vide patet ratio quare  
 ii qui ab alto despiciunt uerti-  
 gine corrumpantur, quod est ob. 2°  
 terrorem, qui cum casum non à viarum obstru-  
 timent, vertigine hancquaquam  
 molestantur. 2. quando uirorum  
 obstructor, nervorum scilicet  
 anteriorum cum enim spiritus  
 solent

Vertigo.

solent motu per meatus fluere,  
 non possunt atque ita in gy-  
 rum aguntur, quod indicat ver-  
 tigo in incipientibus aspectis  
 et ob aspectum rerum ro-  
 tatarum, ut currus, motus mari-  
 nus &c. quod fit ob connexionem  
 spirituum cum spiritibus, qua  
 maior est cum ipsis quam cum  
 aere, quia aere moto spiritus  
 non mouentur; motis autem spe-  
 cibus mouentur spiritus et vice  
 versa. 4. a concussione cerebri  
 et casu. 5. ab halitibus om-  
 nis generis spiritus agitantibus,  
 ut a corrupto sennu, uermibus  
 &c. suscitatis, qui motu cordis in  
 cerebrum tollentur

4°

a concussione.

ab halitibus.

inter partes omnes a quibus si  
uapores oriuntur, apud omnes

medicos ventriculus fero. Considerat  
uerum immoratio (ut quoque in  
multis febribus) saepissime enim  
ventriculus laborat, non ideo

quia semper huius mali focus  
est, sed quia materia uitiosa  
in eum plenius effunditur.

Quare saepius in causa sunt he-  
par et cor sanguinem aliquaque  
humores uitiosos innimis dissoluentia  
ob calorem nimium aut non re-  
cte consequentia. Nec ab his  
solum partibus sit sed etiam  
ab aliis male dispositis, ut utro  
testibus, etc. interdum excitatur

qui etiam si  
a placuisse modicis  
Ventriculo at-  
pta frantur

ab hepate tam  
Corde utro testibus

alij corporis  
partibus ostendit  
possunt.

uapor

Vertigo.

Frequenter stim  
ft vertigo  
a gaudio, ira et  
alijs animi patho-  
matib.

uapor ab ulcere in ipso capite.  
partes haec frequenter hoc modo  
disponuntur a curia, gaudio, ira  
et omni ex ualidioribus omni-  
bus (excepto mortore) minni patho-  
matis spiritus huc illuc agitantib.

Motus huius affectus sic est.  
Fit spirituum in cerebro agitatio,  
postea rotatio, denique tembruosa  
uiso; quia spiritus in organa  
non bene influunt. Et si hoc  
malum diutius protrahitur, ca-

dunt aegri in terram et sentiunt  
aliquam a matre in ventricu-  
lum incidente molestiam.

Magnum malum  
vertigo non est  
raro sui.

E' uentus non est magnum ma-  
lum per se, sed tamen difficile  
curatur; primo quia sanguis

+ Nouicon amicū  
quendam natione  
Gallum cui ex pre-  
cipiti ira uochonus  
ad eo contigit vertigo  
ut sic horas staret  
neque uerum insolens  
ad eo uenisset uenire  
cupido et continua-  
ut adstantes exora-  
famulam et m' non  
exili puererit me-  
tu et terrore. ~~capitulo~~

diffolutus.

dissolutus non ita facile incassatur, *Vertigo*,  
 cum partes ob calorem nimium  
 cum continuo dissoluunt. 2. quia  
 arteria ob continuum cordis mo-  
 tuit impulsum amplius dilatata  
 non facile constringitur.

Si ab agitatione. *Vertigo*,  
 1. spuma quiete ob  
 somnium, si quiet non  
 ressat, sic turbulenta.  
 2. a fome, mera paucis  
 et suco granularum  
 vel vino cunctis.

Item medicina ut ob  
 Endo deobligando vel  
 deservitudo per befer-  
 rias, coquicias, fischer-  
 nitis, lobato, baptis.  
 Specifum summa stram-  
 phaceum ad 3ij. calci-  
 um fraxini, 2. iiii.  
 Serpenti, ceraso, ac-  
 vula usq; pugnacis  
 Damareum et Echinocerum  
 hunc per bus illato, pul-  
 bit hominem exsiccato  
 balio in spiritu, spiritu  
 ferre super ob sursum,  
 thos Hippocratis. *Vertigo*

2. Convalescere, minima  
 3. ff. margarita pectoris  
 callo, rubor. ff. li-  
 2. ff. lori 3. ff. lori ansi  
 n. x. in ag. lobis contab.

4. ff. 3. cellulatum. *Vertigo*, ob  
 latum. 5. a Vaporis et ob  
 humis ascendente granularum  
 vel alburni thermis post cubitorum  
 flum, conforte foeminali, coniuncti-

coniunctio  
 sanctorum primordia, infusum, electrum, et resipiente infusum valvulae, deponit.  
 Tempore per trichole et confute mandibulae et os syphosis, et ab hepatis, sive, ubi,  
 Veneris, 12. defum.

Cura si uenit ab agitatis uer-  
 uis uel a causa agitante, quies-  
 imponenda est, item uene sectio-  
 et purgatio, quibus praemissis uer-  
 ui et humoris sunt sedandi opes  
 atis inter quae theriaca et, e-  
 mulSIONES excessuunt. Si ob flat-  
 iditatem, roborandum est cere-  
 brum; quod etiam utile est qd o  
 ex motu est, id quo maxime

4. Convalescere, minima  
 5. ff. margarita pectoris  
 aqua laudulae, conserua au-  
 callo, rubor. ff. li-  
 2. ff. lori 3. ff. lori ansi  
 thos, oleo cario phyllorum, bacis lauri.

6. ff. 3. cellulatum. *Caput II. de Convulsione*  
 sanctorum primordia, infusum, electrum, et resipiente infusum valvulae, deponit.  
 Tempore per trichole et confute mandibulae et os syphosis, et ab hepatis, sive, ubi,  
 Veneris, 12. defum.

Si ab agitatis,  
 sedantibus curat

Si ab imberibili-  
 tate, reborantibus

Convulsio.

Convulsio est perpetua et inno-  
luntaria muscularum nervis principium  
Irritum contractio Causa

fit 1<sup>o</sup>.

Contingit autem haec tractio  
uel quia tendones dilatantur  
in latum et abbreviantur in  
2<sup>o</sup> ab evicione longum; uel quia exicantur.

Si ab evicione prouenit, non  
est proprio convulso sed contra-  
etura, que sensim incipit ob de-  
fectum alimenti, et sensim de-  
sinit, contra quam sit in con-  
vulsione. Quod exicatio convul-  
sionem non faciat ostendit hoc  
quod nec in hectice nec in ta-  
be (ubi tamen maxima exie-  
catio) fiat convulsio.

Dilatatio tendonum in latum

et abbreviatio

et abbreviatio in longum con-  
tingit, dum a se inuenit uel  
distenduntur uel repletur diff-  
unduntur a se inuenit a mate-  
ria inter ipsos tendones incidentes  
et haec cito fit et cito perit.  
Harsque magis rigida et distenta  
sentitur; si uero sensim fit et  
recedit ~~at~~ contractura dicen-  
da est.

Repletio fit ab humorē omnis māa est  
generis, uel uapori, uel flatu humor, uapo-  
rem spiritu. Ab humorē repli- flatu, spiritu.  
tionem posse fieri indicat  
hoc quod ex dissectis tendini-  
bus humor distillat. Si a  
repletione humoris contingat  
debet is tanta copia in tendines

influere

influere ut eos distendat; sive minus  
hoc faciat et minor copia adsit  
solummodo obstructionem facit, unde  
statim paralysis. Hinc causa  
reddi potest cur aliquis modo  
convulsione mox rarsum paralysi  
afficeretur.

Si flatu frequentissime repletio  
contingit, et cito fit, citoque primit  
Belgus de Cramp.

Si spiritu animali quandovis nimis  
copiosus in tendines influit. Nimirum  
autem copiosus influit vel ob uitior  
sam nervi constitutionem, quod  
scilicet nimirum sit aptus, unde plu  
res spiritus admittit et diffusio  
eritur ut in spastino cynico con  
tingit, vel ob nervorum lesionem.

Domi vel

dum vel natura plures ex spiritu  
mittit, vel spiritus non remaneat.

Læditur autem nervus dum vel  
pungitur, vel ab helliboro aliisque  
naporibus acerbis læditur et  
pellatur.

Si a spiritu repletio contingit  
citio sit et citio perit.

Differentiae sumuntur primum a  
magnitude: alia enim est ma-  
gna et dolorosa; alia leuor et  
sine dolore. 2. a tempore, qua-  
dam recente quadam confirmata

et que nullum admittat cura-  
tionem. 3. a modo generationis

alia primum fit, alia non. 4. a i-  
ncho primo alia

loco affectos alia communis et alia communis  
toti corpori, alia determinatae præ-

Læditur  
nervus pungitur  
vel acribus  
aceribus

Convulsio  
1. alba  
Magna.  
Leuia  
Perna.

# Convulsio.

98

partis, unde oritur iunctio  
taros, opisthotaros, titulos, 5 fac-  
tios, in oculis. T. si oculos in man-  
dibula, nervos occipitales in ore,  
oculopidios in genere.

Signa convulsionis vel sunt futu-  
ra vel praesentis. futura ex pre-  
paratione corporis et ex causis  
sumuntur. etenim illa corpora  
qua suppte natura habent nervos  
inbrevis, et qui facile noxiare  
maternam et affluxionem possunt  
recipere; pariter qui ~~est~~<sup>oculo</sup> ui-  
nunt, multis fugient et crassis  
humoribus alimentis nutriuntur  
facile in convulsionem incidunt.  
Quae praesentem monstrant, sunt  
manifesta signa differentiarum  
a magnitudine.

a magnitudine, a modo genera- Commissio.  
tionis, & tempore uel sensibus  
uel aliter idem sunt manifestis-  
sima.

Euentus malum est periculosa  
et facile prostrant egrum sol-  
licitus lysi <sup>non</sup> et crisi.

1<sup>o</sup>. Cystes permisso alter-  
inundum, uenandum, ut  
hæc adremoribus, expon-  
ut sp. Junc. balsam.  
Quodcumq. 2<sup>o</sup>. Ebano-  
lepis, limonkerne, sib. humorum theriaca, opio uel aliis  
ex coru medicis fudicis.  
3. Uboldum fuscum  
garbanzum, cunctis pl. narcoticis.  
4. Uboldum sib.  
Castoris, cypri, h. rituum tollendo est purgatio  
bistriu, manu, magis habet  
theri, balsam. 5. in ualida. Curo non nisi caute se-  
labundum.

rari. 6. Et. Inungere oportet par-  
tem oleis califacientibus quibus  
in paralyse ut Scorpionum La-  
piorum. anodynis et opiatis si do-  
lor sit nimius debet sedari. opiu-  
m substantia nequid audiunt.

Epilepsia.

## Caput 12. de

Anala. Epilepsia. Vina. de

Epilepsia  
non est

ab exortatione  
ad distinctionem

sed a repletione  
impellente per  
concentricum  
Corium

Epilepsia est motus convulsus  
cum mentis et sensus lesionis.  
Differt a convulsione quod non  
sit perpetua insensorum retrac-  
tio, et accidat cum mentis et sen-  
sum laetiorum.

Causa Epilepsiae non est exortatio  
ne, distentio tendorum a se-muicere  
sed repletio eorum a spiritibus  
non autem ab humoris aut vapore  
quia tam facile omnia illa discen-  
ti non possunt. Repletio a spiritibus  
contingit cerebrum eos ita inordi-  
nate in tendones immittit; propter  
impulsionem autem ita concutitur.  
A concussione autem cerebri talium  
motum prouenire indicat strutatio  
in qua

in qua totum corpus concutitur  
ob concussionem cerebri, adeo ut  
merito struuntatio parva epilepsia  
nocet. Idem etiam liquet in fau-  
tantibus epilepticis, quo cum caput  
si manibus complectaris interior  
conuti cerebrum manifesto depic-  
hendes.

Concuditur cerebrum mediantibus  
ipsius partibus sensum habentibus  
ut sunt due meninges, spinalis  
medulla principium etc. partes  
autem haec concutuntur dum  
vulsicantur aut punguntur. Nec  
tantum partes in crano, sed etiam  
que extra cranium sunt, quoque  
communione cum meningibus  
et aliis cerebri partibus habent  
ut ventriculus, vesica etc.

Vulsicatio haec accidit dum aliquis  
vel pungit

Epilepsia.

mediantibus sensibus  
meningibus vulsicantibus  
aut pungentibus.



# Epilepsia.

(102)

vel pungit vel secat, vel rodit, per-  
ab humore vapor et humor tenuis ex-  
suum corrupto, suppositis insensib;  
et ab abscessu ipsius cerebri  
aut etiam aliarum partium: se-  
cat calculus isque proficit in  
infusa contenus epilepsiam in-  
ducit. Rodunt uermes.

Vel aduersio cere-  
bri ventriculus a-  
pertura.

Altera causa est distensio ven-  
triculorum cerebri a pertuita.  
huius indicium est quod fore a-  
poplexiam epilepsia praeedit;  
quibus duas alias addes causas  
qua epilepsiam producent, in  
qua aliis et inordinatus motus  
convulsus est, et agri quasi  
continuo in orbem undentur mo-  
neri, vel totum eorum corpus  
sursum et deorsum, i. Iusmodi ex-  
grum audi ego vocare qui per  
hunc mons

mensis talis convulsioneum habuit.  
 prius causa est vapor et fatus  
 qui spiritus ita inordinatè ad  
 aliquas partes mittit, posterior  
 est obstructio aliquorum ner-  
 orum et aliorum apertio inde  
 spiritus in aliquam partem  
 abundantius immittuntur,

Differentiae epilepsiarum sunt plu-  
 rime: 1. a magnitudine, alia  
 grauior, alia leuior; grauissi-  
 ma autem illa est in qua  
 excrementsa alii et uscice pro-  
 ter uoluntatem depicuntur. 2.  
 a tempore, alia recentes, alia  
 antiquae. Alia habet accessio-  
 nes frequentes et fere conti-  
 nuas, alia rariores. Noctu-  
 alia, alia interdiu contingit.

Epilepsia alia  
 est gravior, alia  
 leuior.

Recentes alia  
 alia antiquae.

Sigillantes alia habent  
 aduersus alia rariores  
 alia nocturnos

Diurnos alia

que differentia

quo differentia maxime pertinent  
ad curationem certum enim est  
epilepsiam recentem, in qua sunt  
rara accessiones et que nocte  
inuidit, potius a vaporibus a  
cœno elevatis quam alicuius cau-  
sa fieri; que et longè facilius  
quam alia curantur. 3. ab aetate;  
alia in infantibus et pueris,  
alia in adultis et senibus: que  
differentia facit multum ad pro-  
gnosticon: nam sicut in pueris fa-  
cile, ita in senibus aut diffi-  
cile aut nulla ratione licet  
salutem sperare. 4. a loco  
affecto: Et si enim necesse est ut  
cerebrum perpetuo afficiatur, at-  
tamen vel malo consistente in

*Infantum gradum  
est. Adulorum et  
senium gradum est.*

*Sympathica alia  
est. alia Dispositione.*

capite, vel consensu aliarum par-  
tium fieri potest.

Signa sunt presentis vel imminentis vel differentiarum. Imminentis sunt capitis dolor, grauitas, obliuio, pallor faciei, inordinatus linguis motus, hallucinatio oculorum, somni turbati, pigritia ad motum et alias actiones; respiratio impedita; ex quibus imminentia maxima facile est colligere.

Presentis non modo medici sed et vulgo sunt manifestissimae; neque illa indigent explicationem. Si a propter accessionem distantiam de epilepsia sit dubius, licet confirmari ut Alucemas aliquique docent suffumigis ex galbano, mirra, cornu capino etc. quo epilepsiam solent diligere.

## Epilepsia.

Imminentia signant  
capitis dolor, grauitas,  
oblivio, pallor, pi-  
gria, etc.

presentis quilibet  
cognoscit.

# Epilepsia

ut et differentias

(1106)

Solent defigere. Signa differentiarum facile cuius patientis: summa uero quo fimbiente paroxysmo per os excoquuntur, non a pestore prouent sed proximi. ex glandulis ipsius oris, quo et forsan portio quoddam in cerebro autem quiescentis mutu motu effluxit, nam ob huius summa evacuationem sicutam ut agri. de eius generatio est ut causas inde Galenum 2. aphorism. 15.

Euentus. in infantibus facile curatur, et adest quoque spes ante annum 25. postea uero exigua vel nulla.

Cura est uel in, uel extra paroxysmum. In paroxysmo si Infantus fuit aqua laudulae uel aqua Tiliae non

Instinctus epileptica  
Laudulae & fructuosa castanella  
et spir. camphorata, qul  
te uero vel altera in eq.  
antepil. longij, aut pul  
ludi. op. rufus pachys  
quatuor uero sibi Camph.  
et dimid. sit. praescr.

cochlear paroxysmos est. Incedamus et.

Dicitur in deponendas. Non satis obra per se habentes ut ligaturae sint instauranda. ab aliis glandes uel clyster acris isti solerundina. Nato cassano surcini uel uita manuicorda longo et palatum lumen in arteria retinens illucando. Sustentacione ergo leviter extatans respiratione umbilicus apparetur. Iulus ergo ex respiratione migrat. Lindium, ram ob latissimis craniis humeris, delubenda, ~~per~~ <sup>extra</sup> paroxysmum matrice mortis operatis loculis per inferiora lumen habitare. Zonobius, pugnanda.

Hem. sudorificis ut rad.  
Chinæ, juncas. Vistro qui.

Hem. macr. in rebro effigia  
ab lepros. per cithara, ap-  
plicato. Ictericus et  
fatuus. Caput rebri  
cephalus et antepilepti-  
cus. Dactilo rebri  
topropteri, tenui, tenue, rotte,  
ubi ad - fronde rad. po-  
enimur in folio laevi-  
us. cibotia, angulo  
alii postea rebri.  
Vistro qui. magistrum  
Cran. humanum aq. hirundo  
Cerif. mag. tibiae, ol.  
Iust. albi. annulosa  
de fructu sambuci in  
Salteri rebri. Hartmanni.  
Signum profunda sanitati respirore partem qua facit, si  
respira sufficiuntur  
Epilepsia ab utro, à  
fieri ab. curatur et  
metu illarum partium.

non cochlear unum, sed piantam  
bebere debent sulphur aut al-  
bum narinibus adnotum; radix  
Paeoniae, colocynthidis. non possunt  
deglutire. sufflatio in aures  
nisi satis comode successit.  
Extra paroxyscum debemus

ab obstructione qua facit iure purgandi. Epilep-  
tici frequenter  
metuante remunari  
vel plumbum.

dimidiatum motum, purgamus nou-

semel sed frequenter quando  
relict instat nouissimum vel  
pleniissimum; postea robore.

### Caput. 13. de

Incubo.

Incubus est qua homo per so-  
num premi se vel aliquid grauit

Incubus non sumi-  
atque incubans  
pendat

Incidens.

(108)

61

membris sibi arbitratur.

Fa. vel;  
paralyse

Fat autem illud vel ratione  
paralyses, vel quia aliquid est  
in parte quod impedimentum  
adferit (puta in diafragma)  
et quae tenuerunt partes, quod  
a tumore diafragmatis sed  
raro. 2. quia partes qua adha-  
rent sunt granulos, ut obstru-  
cto siene. 3. ab humore incum-  
bente qui premit diafragma.  
Humor autem habet in abdo-  
mine maxime in hypochondriis;  
omnis generis sed maxime mi-  
lancholicus et pituitosus.

Vel ab humore incum-  
bente pituitoso maxime  
et milancholicus.

Vigilantes nocturni quando uigilant, non contingit;  
contingit quod hibernant  
in ad mortem impetus qui a tum maior impetus est ad  
dicit. loquela adimit ob motum. Loqui autem non possunt  
ob compressionem

compressionem diaphragmatis; <sup>diaphragma compres-</sup>  
 non enim <sup>non</sup> necesse est curvare  
 ad impedimentum instrumento-  
 rum vocis.  
 Motus turbulentius dominuntur, max-  
 imus undentur prehendi, vel ali-  
 quis membris, et maximis uer-  
 uoren eximere; vel grauitate pro-  
 minere et postea dicunt Mu. Mu.  
 Sed hoc tantum somnium est. Ut  
 uenit, ita desinit. Raro magnus  
 est morbus nisi praecoxistat dispo-  
 sitione in corpore que sit ad apo-  
 plexiam vel epilepsiam.  
 Cura purgandum liberalius et  
 uena secunda, si tum non desint,  
 uenandum, et tunc emendatur pro-  
 ficia omnia sunt adhibenda quae melancholicis.

Raro magnus  
 morbus nisi dispositio  
 corporis sit apta  
 propter vel epilep-  
 sia.

Cap. 14. de apoplexia:

Cap. 14. de

Apoplexia.

Apoplexia sensus fatigat. Apoplexia est abolitus sensus ex-  
ternus et motus. Dico sensus ex-  
terni: quia etsi contingat sub-  
inde sensus internos aboleri, dat  
tamen casus in quo sensus inter-  
nus salui quadammodo manere.  
  
Apoplexia a paroxysmo  
discunt sibi maria  
conversatae in effuso paro-  
xyso responso.

Obseruauit ego quodam apople-  
cticos dicentes post paroxysmum,  
se maria uidisse, que in bilomini-  
mo sensu externo non uidabant.  
sed quorum species per spiritus  
iam antea apoplecticorum cere-  
bro impressae, illustratae, sensui  
corum obuenierant: Vnde fictio  
ad hoc quodam illis nascebatur.

non dicitur

non additur regentia ablatio quia aliquando tarde accedit. uidi ergo quidem in numeris quadam apoplexiam incipientem ante 6 septimanas.

Causa huius est defectus spirituum animalium in toto, qui necessario in organis esse debet. ut fiat sensatio. Perfectus spirituum in toto est, quia uia per quas fluere debet sunt obstructae. Vix ha obstrukte non sunt arteriae carotides, non recte mirabilis gastrum, non recte mirabile recentior tum; non torcular tunc sanguinis, non cerebri ventriculi, nascit.

non semper reprobatur apoplexia

Effector via a spirituum defectu

h. referunt ab obstru.  
dante viarum

Vix sunt

Apoplexia.

(112)

aliquando pars cœpiti mœnti sunt,  
nec tamen inde apoplexia orta  
fuit; sed tota cœbri substantia,  
vel spinalis medullæ principium,  
ex quorum angustia apoplexia  
eritur. Sed haec angustia in  
principio tantum spinalis medul-  
la fit, sensus interioris constare  
potest. Et si enim spiritus ad orga-  
na influere prohibeantur, nihil  
minus illi qui ibi adhuc sive sunt  
sive cœbri substantiam fluere  
possunt et sensus illi impressas  
illustrare. Si vero tota cœbri  
substantia angustatur, contingit  
obliteratio sensuum interiorum  
et exteriorum.

Angustia haec tantum est obstrutio, vel  
compressio.

*Tota Cœbri substantia  
vel spinalis medullæ  
principium.*

*ab illa totali ab  
haec partiali erit  
apoplexia.*

*obstrutio vel  
compressio Cœbri.*

obstructio totales non sit a sp̄c̄  
ztilis sed ab humoribus omnis  
generis et frequentissim in  
sanguine et pituita, unde apo-  
plectici feri aut rubent. aut  
pallent: interdum quoque sed  
raro a bile et melancholia.  
obstructio hæc ad sensum debet  
esse totalis. non partialis nisi  
in principio apoplexie.

Compressio fit vel a dispresso  
crani, ab iectu, concussione, la-  
psu etc. cerebrum uero usque  
comprimente, vel fit quoque a  
quolibet humore per arterias  
excedente aut per congestionem  
ibi collecto.

Differentiae. alia est initis in

qua responso

respiratio fere salua manet, alia  
gravis, in qua fere abolita est  
et cum Stertore accidit

Signa sunt vel imminentis, vel pra-  
sentis, vel differentiarum.

Imminentis; ager torpidus est, et  
paulatim torpor augescit, capitis  
dolores, gravitates, somni profundi,  
timor aurium, vertigo, tremore  
vel totius corporis vel ~~partis~~ partis  
in somno sterter et stridor denti-  
um; corporis universi et imprimis  
partium externarum frigus in-  
solitus. Si subito ingrat, pro-  
cedit sive aliquis motus convul-  
sions, isque non uerus, sed aliquā-  
lis a mā illuc incidente postea  
imminuit sensus et motus; quod  
primo in lingua animaduertitur  
et tandem deficiunt. Respiratio  
primo bona sensus difficilior  
redditur, sensimq; perit.

Signa pathognomonica sunt  
manifesta

manifesta: differentiarum quoque Applexia  
 facile patent. Sumuntur autem  
 ex maiore vel minori respirationis  
 lesionis. Itaque si forte respirati-  
 one omni iudeatur aeger carere  
 opus est vel nitido speculo vel uas-  
 pleno aqua ori uentriculi imposito,  
 vel alter experiri num aeger ui-  
 nat necne. Signa per conseruit  
 obstructis urinis et arteriis spiri-  
 tum uitalium in cerebrum diffe-  
 rentibus, ex morbis partium in-  
 ferorum facile colligi possunt  
 praterquam quod uasa utrinque  
 in collo que recta usq; in calua-  
 ria basin feruntur, longè turge-  
 diora apparent.

Signa autem quibus Applexia,  
 Epilepsia, carnis, catalepsis, syncope,  
 uteri profocatio inter se distinguantur,  
 habeantur apud Galenum  
 & de locis affectis. 2.

Evacuatus. Morbus magnus est  
 quo aegru

Apoplexia. è quo ægri plerunque moriuntur;  
et sic carus gradus inferior est  
apoplexia; apoplexia syncope.  
In syncope e. omnes facultates  
abolentur; in apoplexia animales  
tantum. Durat vero duos vel tres  
dies et in debilitatis ut sope in  
leucophlegmatice 24 horas. Definit  
plerunque in paralyssim, et mens  
aliquando vacillat aut oculi  
continuo collachrymantur.

Cura. statim ab initio ualidum  
dandum est purgans ut Infusio  
borelli, Colocynthidis, scammo-  
ni. Deinde bibenda aqua apo-  
plectica, ut aqua l'auundulae,  
Castorei, Camphora, Cysticor  
utilis quoque sunt sed cum diffi-  
cultur exhiberi possunt coram  
loco damus suppositorium.

Si rubedo in facie sit et pletho-  
ra, largiter feranda est uena:

Cura nulla s. adiff-  
uti respiratione sive  
superiorum aut inter  
curabiles apoplexia cura  
explorata pientibit uel  
1. condilam acetosam marini  
2. iunctum ex sporulis hepatis  
marinis aduentum regale  
3. adules libra atri, plus  
zanthox. salicis et uolu. fons  
2. per levare Capiti impedita  
per puls. clyster et glandes  
per buccam jugularium, rectale  
vel indumentum pulchrum  
3. aquæ autopropriae 3 p.  
tubif. nigra. pura reinfusio  
tubif. balsamplana, sur-  
mata,

(117)

Caput quoque totum tempora; Paralysis  
michi am fricare oportet oleo  
succini, aliis quo frumentibus o-  
leis. Cauteria autem non nisi  
in summo periculo adhibenda.  
hac remedia si agnum non libe-  
rant, singulis diebus sunt iteranda.

### Caput 15.

#### De paralysi.

**P**aralyticos eadem ratio ac apoplexia.  
Si obstructio sit in alia parte  
quam cerebri tota substantia, aut  
principio spinalis medullae, unde  
in paralysi principes facultates il-  
losa sunt.

Cause etiam eadem sunt nisi quod  
in paralysi tertia addenda sit, se-  
niorum contorsio per quos sputus  
tum commode fluere negat.

Differentia 1. sumuntur a loco. 2.

a magnitudine

2. a magnitudine 3. a tempore, principio augmento, statu et deductione  
4. a modo generationis alia primo  
<sup>incipit</sup> generantur, alia aliis morbis suc-  
cedit.

Sigina futurae paralysos ex  
tribus potissimum desumuntur.  
1. ex preparatione corporum,  
qualia sunt fugida, humida, et  
laxa, qua habent nervos imbecil-  
les. Inestate, regione, tempore  
 anni, cali constitutione, fugida  
et humida corpora, qua uetus  
rare, et stidiis utuntur, ex  
quibus multi et crassi succi possunt  
generari. 2. Ex profectibus cau-  
sis morbificis qualis sunt copia  
inflammatoria, putentes ac potissimum  
in capite incisio nervorum, contu-  
sio, et sanguia. 3. ex modis qui  
busdam dispositionibus qualis  
sunt gravitas capitis, difficultas  
sensus et motus, stupor et  
alia id genus.

Sympt.

Signa a. pathognomonica sunt *Paralyticis*  
fere manifesta.

Exventus tardus est vel durat  
si res bone peragitur et succedit  
ad 3 meatus, interdum etiam ad ince-  
gium annum.

Cura nulla est a locutione  
vertebrarum aut nervi inguinalium.  
Difficit in sensibus, in mem-  
bris extenuatis, peritiorum et ambu-  
liorum latenter inserviuntur, si post  
apoplexiā, franguntur et tra-  
nscendent aut prostrati, aut si  
interventus adtra est rotulam.

Si honor aut fibris impinguantur

et ab intercipienti nobis

ob patientem leviter et tenui-

ter perducuntur, non et leviter

exstant ex tacto rapi-  
to, hellebore signo difficit aut.

2. Proportiones, ut 200. 300.

Si primus dorsum, aliud ventre;

3. Tertius leviter et rotulam

ad intercipienti nobis

hunc ducuntur, non et 300.

Quatuor et quinque, et leviter

et tenuiter, q. Eboracum

et dicitur paralyticus per ratione-

mopologum, q. hepaticum

apparetur et fortior est in

aut percutientiam ictus fallax

et non fit, laborum in uno mal-

ad alterius in sepe, laborum cum

fringuntur et subfringuntur.

4. Sunt Veneris, undevies et

unguis deponit, de periculis,

5. Cithara, anguis lati-

us, leonis, ornatissima lumenaria,

plumbum molle, vel antiflatal.

6. Quibus Horae in nocte late-

6. Natura calida et secca.

Paralyticus aliisque a telo

est pars sita Veneris, Canticis

et ictus, pangathos et opis trophae

Si paralyticus est a scorpionate

non ab ictu, videretur

hunc miserabilem.

Cura eadem quæ in apoplexia et  
quidem primo purgamus, immi-  
grans partem affectam, et spinam  
frangamus; Lanamus quoque parti  
affectam aquâ cibis. Poterit  
aliquando motus constante fa-

ci, quia uermus ita obstructus non  
poterit procedere, et ictus, aliud  
spiritus sufficiens ad seu-  
perationem, et reparationem,  
adserit et colligat, et  
adserit et colligat, et  
sensus remaneant, inotu, sit quia  
uermus ad motum cutim deficiens

hunc obstructi, reliqui vero qui  
ad interioris uergunt sunt liberi  
quod tamen rarissimum contingit.

Pars paralytica sepe friget ob  
defectum spirituum animalium.

Sine quoque flaccescit et quasi  
enioritur.

Catarthus

Medici aliquando falluntur in paralyticis quorū spinae vertebrae aliquatenus exinxerūt nam putant spiam luxatam esse et paraly-  
sus induere. Tremor.

Tremor est duplex, vel omnī  
est impotentia mouendi partem  
vel impotentia continuandi in  
quiete. Impotentia mouendi est  
initium paralysies et rascem  
etiam habet causas. Impotentia  
continuandi in quiete est mo-  
bus convulsivis et convulsions  
causas habet.

## Caput 16.

De excrementorum capitū symptom-  
atū specie.

## De Catarro.

**C**atarthus est humoris super-  
vacanci in subiectas partes delapsus.  
Humor illi supervacans est

omnis generis: serum frequenter  
solum. bilis raro sola frequenter  
cum pituita et sero permixta.  
pituita raro sola, frequenter cum  
bile proque permixta.

Humor extraaeratus cadit vel  
per foramina ossis sphænoidis  
vel per os ethmoides. vel per fo-  
ramina ossis occipitis, vel per  
spacia inter nasa et musculos,  
non vero per alias vias.

Locus unde hoc fluxionis materia  
est, vel intra cranium est vel  
extra. Intra cranium ut ven-  
triculi et interstitia intra cra-  
nium et cerebrum. Extra cra-  
nium ut spacia inter calvum  
et cutim.

E. ventriculus humor sic deci-  
dit in infundibulum, tum in  
glandulam pituitariam, pos-  
ter in os.

Ex interstitio inter calvum et  
cerebrum distillat per os ut  
ethmoides

os intus istes in naribus, per os cuncte  
formae in partes oris, et faecum  
per gullet in ventriculum, per  
guttur in pulmones, thoracem,  
cor. per foramina ossis occi-  
pitis in dorsum partibus prox-  
imi adiacentes.

Extra calvam defertur inter ua-  
sa, musculos et cutem via media,  
decidit in collum humeros, bra-  
chia, cubitum usque in manum,  
pectoris musculos, cervicem etc.

Huius fluxionis causa consistit  
partim in humoris ipso, partim in  
parte. In humor, quando humor  
minus tenus et fluxilis est adju-  
uante sua gravitate.

In parte ipsa 1. quando minus est  
potosa. 2. quando via minis au-  
pla sunt, et aperto facta est, re-  
uel per spiratorum spissitudinem vel  
crevaturom, quod apparet in conti-  
nione thoracis quo admodum dif-  
ficilis est cura, quia semper ad

ad has partes aliquid affluit, dum  
una si datur ob contusione m. un-  
de et si qui catarcho obnoxii su-  
erunt, facilius iterum eo corrup-  
untur, min' semel preparata ad  
humorom recipiendum a priore  
Catarcho. 3. quando pars hanc  
materiam expellit, vel copia vel  
qualitate irritata: ad quod per-  
tinet fugus constringens. ut quo-  
tidiana exempla docent.

Humor peccans sive sit intra sive  
extra cranium ille loci stabu-  
latur, quia ibi generatur vel ali-  
bi generatus eo perirent, vel  
alibi gentus detinetur ubi non  
dilebat. primo generatur ibi ob  
interponem vel calidam quae adu-  
ret vel frigidam vel humidam  
qua non ita convertitur in partis.  
an etiam ob similitatem mortum est.  
2. humor alio loco gentus in  
caput pellitur, vel iactio partis

Catarthus partis pollutis s. mittentis uel uitio humoris missi uel mittendi.

Vitio humoris quando tenuis et calidus abundat in corpore, qui in caput facillime exit, quia illuc aliquid exire debet pro generatione spirituum animalium. Humor tenuis et calidus est, quia assumpta talium materialia praebent, uel quia partes concoctiores calidæ minis sui characterem sanguini impriment, uel quia aliud in corpore retinetur, quod retineri non debet, ut mensis, et frequentissime cum bilis per secessum non exit, iquo leui purgatione curantur. Vitio partis pollutis quando ea possit pollunt partes quando cor potentius pulsat, quod rursus ob uarias causas potest accidere. Ut cor possit in caput ita quaqua uersum in alias partes

alias partes; et in illis varios  
mortos producit. u.g. in collum,  
facit anginam in membranam  
costas succingentem, pleuritidem  
spuriam: ad colon, dolorum colic:  
cum: ad artus. arthritidem etc.  
et hoc species Rheumatismi dicuntur.  
3 humor alibi genitus de:  
finitur ob partium constrictio:  
nem.

Ex centenis mixtis unius catarrho  
laborat cuius causa in cerebro  
latet. Quod vero veteres caput  
fero semper partem affectionis cre:  
deret, causa haec est, quia vide:  
bant ferro semper ab eo ortum  
summitrahere. Verum quoniam a  
capite plerumq; defluat, tamen  
caput in causa est, sed hoc ideo  
contingit facillime, quia aliquis  
semper a corde in caput possit  
tum ob inclematem, tum quia ibi  
(ut dictum)

(ut dictum) aliquid naturaliter semper exire debet.

Differentiae sumuntur ex causis, copia et quantitate materiae, ex qualitate materiae destillantis, ex modo quo materia evanescit, a modo generationis, a tempore, a conjunctis; vel cum, vel sine febre.

Signa presentis distillationis sunt manifestissima, si in capite causa non sit. I. Ipsi cordi molestia est materia, quia cor transire debet, antequam ad cerebrum perveniat.

Eventus. Non est periculosus morbus, nisi copiosa materia ad pulmones ruat. Et quando regitur, cessat intra triduum, quod de ordinariis cataractis est intelligendum: si e materia continuo defluat, longius etiam proteahitur.

Cura.

Caro et differens si Car-  
bonis sunt squamis et  
gratibus, si nephritis, - se-  
rebus, et rara volta phlegma  
differt & minus gravis ob-  
structionem, 2-partes reparationis;

number of 20 parts 2000000,  
3. many floating volcanoes  
throughout the globe.  
4. very little rain, except  
against certain mountains,  
and in some marshes at  
depth below marshes  
but more, owing to elevation,  
than owing to deserts.

*Uroctonus mordax* (Fabricius)  
var. *Uroctonus p. californicus* (Adams)  
Ventralum fluit, s. ad com-  
lit per gary m. et appelt.  
Capitulum s. ad. *U.*

latus longus concavus, rectus  
in flexu. falcis. fuscus pul-  
vrius - fuscus et fusca  
vix malabar. Calcaris et  
alii tunicis guttae aligatae  
affinis et ruficollis et tan-  
tillatus et virens illius. Vire-  
nus affinis. Radiosa. G.  
affinis. Dorsata. Guf-  
fus. Calcaratus effusa. Cefal-  
onotuberculatus et attenuatus.  
Dorsata hyalina, rubra, oxy-  
milia, simplicia et rotula-  
tum acutangula. Pluteo-  
ciliata, ciliata, ciliata  
et, minus nigra, tenuissima  
et pallidissima, ex. majoribus  
variolis in sufficiens vel attenuata.

variolos - griffellos - mit acht  
Lapset zehnendem Kopf, für  
zwei bis drei Tage lebend.  
S. a. humor. Calid. 1. blab  
verformt. Curculio. 2. p  
pumariae. engraphobius. 3.  
curculio adhuc curculio. 3. Eba-  
runcus liberator.

Si cum impetu reat inop-  
tus, ut si quis in post expon-  
it latere, nequissimum est illi  
mora revent, belis armatur.  
Officium, huius autem  
est - operarium, pectora.

Aug 20, 1881, at 10:30 A.M.  
Winnipeg, Manitoba, Canada

Thunis irregularis, sp. q. a. 3β.  
Cross 71. Cane f. q. pop. R.

*Catarrhus sufferrubus subtilis*

... et de la morte. Cet état d'insouciance

John L. & Co  
Cincinnati 31. Augt. 1868.

~ 3/3 201-2081. sin. 31/3.

### Cura I. Aluis lentei soluenda

ut semina cum pruini. & ab  
omnibus liquidis et humectanti-  
bus abstineendum. 3. Bibant Ex-  
go nimium vel ceterisiam ana-

ram non etiam ultra uncias  
septem. Postea siccetur caput  
fumigio thujis et eugenii applica-  
tione. Si his non cedat, uena  
secunda, ne cor adeo potenter in  
caput pellat. Bibant infusam  
rhabarari cum iuvis Corinthi-  
acis, et interius bis de die duo  
cochlearia aquæ uite Matthioli.

quod faciendum in longis caten-

## Caput 17

Oculorum morbi, symptoma-  
tae et causa corundam.

*Visio locatur quando depravatur*

*Croce 37. Cum s. q. pugn. Rhod. Compil.* u. l.  
*herbasque pugnab. misericordia.*

*starkius* *affinis* *subtilis* *caerulea* *submarginalis* *cyathibus*, *fructibus* *Euclastis* *caerulea*  
*barbata* *affinis* *caerulea* *capitata*, *mucronata* *caerulea* *inconspicua*, *affinis* *caerulea*

menta nihil presentant. Quod Charles reg. sicut obnoxii singulis mortibus suis  
ante novi humani corporis purgare debet, perit. Si alius scriberet. Viximus admodum

Aug 10-12 habet 2 Corio myrobal. Etiam cum omni medicinae cito tota a 375 p.  
Cinnamomum 31; caraphyll. 20; longa 20; cubeba cardamomi; gran. paradisi; mace;

317. per author Leland. n. 318. in two vols. Demy.

uel immixtus. Depravata continet  
igit 1. quando omnia videntur ge-  
mina; quod contingit quando pupillae  
non sunt in eodem plano, seu  
cum altera altero, depresso altera.  
pupille a ita constituta sunt  
uel ob conformatiōnem naturalē,  
uel ob commissiōnem. 2. Quando  
omnia videntur candida, quod con-  
tingit ex humore candido inter cor-  
neam et crystallinum hærente.  
3. Quando videntur vobis tare aut  
oculos vel obscuras vel alio colori  
afficta, prout humoris vel vaporis  
color et consistens est. 4. Quando  
quidam propinqua tantum vident,  
quidam longinqua. Propinqua  
tantum bene videntur, vel quia  
tunica cornua minus est rotunda,  
ita ut species in illa ad minimum

quantitatē.

quantitatene colligantur, unde  
eadem si longius absunt, quia hinc  
minora offeruntur, non possunt  
reprosentari in oculo. Quod apte  
videmus in speculis quibus orbiculi  
ad marginem positi sunt. Si ad  
hos propius accedas, te totum uides;  
si longius, nihil quicquam uides;  
sed tamen in plano speculo optimè  
potes, vel quia est intimum, cata-  
ractæ. Longinqua tantum  
uidentur quia cornua immis est  
plana sive; contraria causa est  
prior uitio.

Cæcitas et diminuta uiso contin-  
git i. quando species & bene of-  
feruntur. 2. quando species ob-  
late non bene agnoscuntur 3.  
quando quis non agnoscat se cog-  
noscere, hoc a. contingit ob di-  
minutam potuitam sensus communis

ut apparet

ut appareat in effectibus soporosis.  
species oblate non bene cognoscuntur, quando spiritus animalis  
non bene ad organa fluunt, non  
fluunt in organum quia defunt,  
defictus contingit vel quia in  
toto deficiunt, ob negligias, nece-  
ssaria et evanescencias nimias; vel  
in organo tantum, quod sit qua-  
do alio uergunt, ut in uertigine  
vel quia ad organum uenire non  
possunt ob nervi optici obstruc-  
ctionem, quod ultimum uitium  
catarracta nigra vocatur. x gutta serena.

+ Species non bene offertur vel  
quia non bene uenit, non bene ne-  
nit quando aliquod impedimentum  
est ob quod species non bene  
transire potest ad retinam  
tunicam, quod accedit vel ob nigrum  
oculi qui in cornu oritur quando  
intemperata est, unde alia uoluti

(151)

cornea surrexit, quod contingit oculor. et horbi  
uel ad externam uel internā cornae  
tunica superficies. Si oriatur ad  
externam nostratibus dicitur eeu  
perire si ad internam eeu  
ulicet uel etiam unguis oritur  
ob cicatricem in cornea. Secun-  
dum Impedimentum est humor  
crassus haerens uel in cornea  
tunica ipsa uel in humore aquo  
intra etiam in uiteo, ibique aqua  
catarracta oritur ac in aquo.  
Hoc uitum catarracta dicitur  
oriturque dum crassus talis hu-  
mor fluit illico uel per arterias  
uel per nervos.

Cataracta in oculo varius fitus  
est. Aliquando prope ad crus-  
tallum haeret quo nisi uix et  
summa intusione uideri potest,  
ad eo ut <sup>sepe</sup> cataracta ~~f~~ talis

magis.

nigra censatur cum tamen re-  
nra non sit. Ut autem haec  
uidcas, regis nec in opaco loco (   
quia ibi nihil uidetur potest) ne  
in loco admodum lucido, quia tunc  
pupilla minus constringitur, sed  
in mediocre luce constituantur.

Tertium autem impedimentum  
ab auctoribus affectur incrassa-  
tio et excreatio humoris cristal-  
lini, quod auerum sit uenit  
affire non ausus. ~~c. 22.~~

Denique species non bene reci-  
pitur quando retina tunica mi-  
nis lucida est, quod fit ob dilata-  
tionem pupillae quam efficit hu-  
mor in tunica conclusus, eamq; dis-  
tendens; aut etiam scirrhos, phle-  
gmone vel abscessus oculi.

Cavitas cataractae sensim invadit  
et inducit nubilam.

Siccatas Crystallini humoris fit sceler. Morbi  
ab igne vel humoris bilioso.

Dilatatio vel ruptio pupillæ in-  
si, a cassione exteriori fiat, fit  
ab extimo fluxu qui uniuâ co-  
piâ effluens rumpit; vel etiam  
dilexitate hoc fit.

Cataracta nigra est vel obstruc-  
cio vel compressio.

Vnguis incipit ab angulo, à  
parvo principio et excrescit ulte-  
rius fere continuo et si abradas.  
Albugo fit subito. Cataracta  
sensus, nigro sensus.

Pupilla dilatatio et ruptio fit  
perdetentum et fere continuo incer-  
cit neque unquam curatur.

Obstructio fit subito et procedit  
dolor capitis.

Albugo non ita periculosum. Un-  
guis periculosior.

Cataracta.

Cataracta primo nigra periculosa,  
pupilla item dilatio periculosa.  
Cura prospiciendum primo est oculo. Vnguis abstergentibus ut  
fessi pisces, Sacharo Cando, succo  
scallitico curatur. Albugo perso  
curatur. Cataracta debet fisti ab  
intimo iuuenatione, purgatione, re  
ficatoriis post aures, fontanella in  
collo et postea in brachio.

Obstructione insidem remediis curatur.  
Bilatatio fistit a causa externa, ex  
cauandum eut plumbum quo oculus  
detinendatur. Si ab interno, ut cataracta  
curatur. Cataracta quando  
perfecta est acu tollitur.

Queritur an cataracta tolli possit  
quando est perfecta, et an iustus  
terruum restaurari possit. R. J. quan  
do aegri vel inimicorum uideret possunt  
tunc curari potest, qd nihil uident non  
curatur, nisi tollatur ecce nam hinc obstruetur  
est uetus opticus.

Cataracta ita uadetur  
1. manu obstruere Durum  
per medicamenta pilosum  
zogo, lumen pertinet  
2. Et 1. Dorsathrum 2. per  
curvulum. V. frust. rebello  
3. per spira d. fundendo  
in aqua folla. Hunc re  
medium Robig. 1. 1. Labet  
2. folla galli 3. p. Sunt  
mucis 3. cib. cum lacte  
masticis collig. instar  
ad motum. Vel aqua  
Hinc lumen cum filo  
masticis et liquoris  
Sacharo Cando, rafato  
et margante p. p.  
4. Camugia de qua  
vide aut hanc.

Caput.

Narium morbi, symptomata,  
Causa & signa.

**S**ymptomata narium sunt  
vel actiones abolitae, vel diminuta  
vel dopravata.  
Abolentur et diminuantur vel quia  
non sit delatio siccitatis, vel dela-  
tio non agnoscentur, non difini-  
tur, quando naros sunt obstructae,  
vel a tumore, polypo, sordide ulcere-  
ant externa lesione ossis, vel ab  
obstructione ossis infusidris quo-  
dit vel a petraita vel a sanguine raro  
vel alio humore. Specus non ag-  
noscentur ob easdem causas se ob-  
structionem vel compressionem.  
obstructio fit a frigidis humeribus,  
compression fit a mucro exribri, raro  
fit a compressione conibri.

polypus

polypus succedit vel ex lesionis mem-  
brana inuestientis nasum vel os ut  
moches. lesio a. fit ab intemperie  
simplici, vel fugida, vel acrimonia  
catarhi, vel a lesione rei externae  
ut ab unguis, stylo &c.

Vlens narum vel ex catarrho vel  
ex lue venerea contingit.

Obstructio a Catarcho fit, si a san-  
guine fit, ruphone.

Motus polypi. sensim angustiam senti-  
unt, et frequenter catarrhos, postea  
difficulter trahunt spiritum per na-  
res, et tandem aliquid proximunt.

Quando Vlens adest, sentitur sanguis,  
piritus, dolor et crux in naso.

Si ex lue venerea, signa ipsius  
praefiguntur, nec hoc curatur sed con-  
tinuo uergit in deterioris et es decidit.  
Magnum impedimentum non adest et  
non est aliquid periculosum. pro  
diversitate causa vel cito vel tarde

mept

mept. De finit. Avoe.

Morbis Xarium.

Cura est raro causae iuga a polypo  
sporet aqua distulonij vel fortitudin-  
gatur et sensim invanuitur ad de-  
cres usque; quidam tamen ~~reducunt~~  
Caput sic audiunt est odorat vel  
utribus cephalicis.

In ulceribus incl. cum tutchia et  
excitantia. Si a luto uenient, vel  
cum & dulci si ab osse ethmoidi-  
tum odore grande, ut hancut et  
purgantes confectione salicinal  
vel diagadio; Steinum atollis et  
odoratis; calidis ut nigella; oleo  
mucis moschatae, caryophyllorum.

Hæmorrhagia est, quo uas h.c. arte-  
ria carotides externe aperuntur,  
quod fit vel ratio uicis vel ratio  
sanguinis, vel ratio pallentis.

Curatur gramine vel succo citri.

Caput 19

Aurum Morbi

(138)

76

Caput 19.

aurum morbi, symptomata  
horumque causa & signa.

Aurum actiones sunt vel abo-  
litione vel diminutione vel depravatione.  
Surditas et immunita auditio con-  
tingit, vel quia non audiimus vel  
non agnoscimus nos audire. Non  
audiimus vel quia species non affer-  
tur, vel quia oblate non agnoscitur,  
vel etiam quia spiritus in cerebro  
turbati sunt. Species non effectur cum auris ex-  
terna absissa est, 2. cum mea-  
tus auditorius occlusus est vel  
nudus (quale Egonet audi exemplum  
in pueris) vel a morbo ut coalescen-  
tia. Latra et rima exasperata coa-  
lescent. Constipatione quando suc-  
crescat tuberculum aut fungus. Ob-

shaken.

obstructione vel a causa interna  
ut quando sordes inducuntur, vel  
externa ut quando globulus vel  
pisum in aurum incidit.

In tympano uitium est, propter ui-  
mam densitatem quod in scribus.  
Hoc ob viminale et apertum humo-  
ris pertinet et iudicetur affluxum,  
deinde quando tympanum impetratur  
ab ulcere vel simili occasione.

De tinnitus s. sibilo

a u r i u m .

Tinnitus est sonus qui praeter na-  
turam in auribus animaduicitur.  
Est vero causa in auribus non in  
cerebro, quamvis agri dicant se mo-  
lestiam sentire, in cerebro tamen  
non est, quia curatur si aliquid  
auribus apponatur, non cerebro. Sit  
autem quando aliquid praeter na-  
turam in auribus restat, quod est  
vel naturale vel puerale. Næ-

Natural.

Aurium. Morbi.

Aurum Morbi

Naturale sunt temora excomponita auris, vel spiritus. Quod madit in auris est humor omnis generis sed maxime serotus et biliosus, ut et molachorius et flatus serosi, vel ancholici vel ex tenuiori sanguine prout auctem illa materia illudit in aures facit sonum: si in partem duram, durum sonum dedit, mollem, si in mollem.

Materia autem frequenter venit ex Lieno, utero, et etiam ex ventriculo, et intestinis per arterias.

Motus. Primum agitatio oritur in cerebro, Et inde est quod dicunt aegri a cerebro fieri, postea continuitus vel in una vel in utraque auro. In initio leniter, postea impedit auditum: celeriter sepe accedit et definit, sed fit quandoque tam tardus.

Magnus

(141)  
Magnus morbus non est definit  
Avor

Dolor dentium

Cura pro diversitate cause varia-  
si a sanguine vel catarrho, uena  
est secunda et applicanda auribus  
qua apertis ut educunt; ut sunt  
Mercurialis, parietaria, ol. amig-  
dalorum dulcium, spiritus vii.  
Ipse curauit regum qui totos octo  
annos laborauerat uitio auris, unde  
aliquid semper diffluebat puris, solo  
unguento Egyptiaco.

### Caput. 20

#### De dentium dolore.

Quando dentes uidentur dolore, do-  
let membrana non dentes. dolet  
autem membrana quia soluitur con-  
tinuum, quod fit vel a fugore con-  
stringente vel à re pungente, ro-  
dente, vel duellente,

Jungit

Dolor dentium

(142)

pungit primo sonus dentis corrupti,  
qua<sup>e</sup> res maxime est in causa, sa-  
mies autem uenit ex dentis cari,  
qua<sup>e</sup> caries uariis ex causis origi-  
nem habet: vel ex humiditate  
vel ex erosione. Secundo punctio  
fit ab humor<sup>e</sup> acri omnis gen-  
ris, ex sanguine calido, bilioso,  
salso, pituita salsa et sero: aodo  
ut a melancholia naturali, sed  
maxime a seroso + salso. Influit illi  
humor per arterias, quando ejus  
modi humor abundat in nostro cor-  
pore; vel ex uictu precedentis, vel  
ex impedimento exercitentis exar-  
uendi, vel ex constructione cutis,  
vel detentis monstrosis.

Rodunt uermes vel ex corruptione  
vel sanguis et humoris influxu orti.  
Divulsio fit a in illata dentibus,  
ut ex fractione ossium cerasorum  
aut quando male extraficitur dous.

motus.

Motus. deus fit causa, postea in eo oritur aliqua pulsio nostratus dicunt (het popelt) postea se quatur dolor, cum dolore fibricula et sputatio. Prout est influxus humorum ita est dolor. si nouus influit humor, nouis exoritur dolor, postea incipit tumescere gena, vel gingiva; tum definit dolor.

Cura. si dolor sit leuis oportet caritati dentis morta sal. si dolor granior est, purgandum. si vehementissimus, secunda uena. si tum non defmat, indimus denti oleum nitroli, organi, gariophyllorum. si hisce non defmat ad narcotica et extractionem dentis est confugendum.

### Caput 20.

#### De angina.

*Angina*

*Angina*

Angina

Notitia Angina fit

ab

angustia in phib.  
faucis

Augina est quando via deglutitionis et respirationis præcluditur.

Fit autem hoc ob angustiam in fauicium partibus vel in gula, vel larynge, vel in gutture. An-

terrog; Atrum gustia autem varia est. 1. sub-  
sidentia, quod contingit in pa-

subsidentia. 2. coagulatiæ gula peculiaris. 3. Coalifi-  
cation. 4. convulsio. 5. Constrictio-  
ne. 6. obstructione. 7. quod contingit ob assumptu-

solanum somniferum. 4. Convul-  
sione. 5. Obstructione quod raro ut

in catarrho suffocatio. Haec  
omnes causa supra dictæ produ-  
cunt notitiam anginam.

Vera a. fit

a tumoris orto

Vera autem angina contingit  
a sola constipatione, aut com-

pressione non tamen omni, quia  
et ab his causis spuria oriri po-  
test.

Contingit constipatio cum tumor  
extiterit

(145)  
oritur interius vel in larynge  
vel in gula vel in guttura. Tumor  
hic a variis humoribus fit adeo  
ut nunc sit plerumque  
modo Essoit latuus et tunc  
nra oritur angina, nra adeo  
matosus et scirrhosus et notitia  
producitur.

Compressio fit ab externis  
causis, nisi quod tumor sit exte- Compressio ab  
rius in musculis, propter eas  
causas que in constipatione  
allata sunt. Etiam compressio  
fit a luxatione vertebrae in-  
teriorum quod raro: et ab in-  
flammatione muscularum cervi-  
cis.

Et autem compressio et consti- in facies phibis  
patio accidunt in superiorum  
faucium parte ita etiam in  
in inferiori, et medio gutturus et gula  
specie

spacio; sed caro. atque hoc  
quidem causa in genere.  
humors si fluunt et arterijs humor hic uenit e uasis, et ex  
arteriis quidem ordinariis, et me-  
no sed caro. sit tamen quam-  
do uena oclusa sunt aliquo  
modo ut frigido. Eadem in  
compressione et constipatione  
ratio est: que differunt tan-  
tum, quod constipatio oriatur  
a humore ~~et~~ interno, com-  
presso ab externo.

## Causa

Fluxus autem causa est uel  
humor. 2. am- tenuitas uel copia humoris sau-  
philia eius. 3. pars genitis. 2. amplitudo uiarum. vix  
laxa. 4. pars mox autem ampla et apertiores sunt  
uero, uel pellentes uel ob consuetam fluxionem, ut ap-  
partet in iis qui sepe agmina et  
inflammatione corrupti fuerint.  
3. in parte ipsa affecta, si sit  
laxior. 4. Causa est in ipso mo-

mentis

( 147 )

monente quod uel possit uel trahit  
uel retinet. possit eorū potentius  
quam debibat; uel propter animi  
affictus uel cum cordi aliquid  
est molestum. Trahit pars ca-  
lore uel dolore. Retinetur in par-  
te affecta ob constructionem  
ab externo frigore.

Differentia sumuntur 1. a loco      differentia 1. loco  
affecto. 2. ex natura humoris, 2. humoribus. 3.  
noxij et fluxionis. 3. a magnitudine, 4. longitu-  
dine. 4. a tempore principio, 5. graduis mode-  
ri. 5. a tempore declinati-  
onis: qua uaria tempora maxi-  
mū sult animaduertenda, cum  
uariam curandi ratiōem et pra-  
fida requirant. 6. a modo ge-  
nerationis. 6. a coniunctis:

alia cūm, alia sine febri.

Signa sunt difficiles respiratio-

respiracionis, reglu-  
tione, dolor, humor,  
nubore, calore, febri-

et dol.

Angina.

# Angina.

(148)

deglutitio, dolor acutus, tumor,  
rubor, calor, fibris, pulsus rarus,  
durus, densus.

Motus. quando Erysipelas inflammatio  
aut phlegmone. primo die conqueruntur;  
rauendo ortur, tenuis fibrula adest  
quae eodem die intermittit; secundo  
nervi exacerbatur rauendo, et de calore  
conqueri incipiunt utque tum fibris  
non intermittit. 3. Calor, dolor, tur-  
mor, et alia materia. hic tumor si  
sit in gutturo vel gulo non ita fa-  
cile conspiciatur; sed rubore in fac-  
ebris inducat hac materia est. At  
die pessime laborant; et hic cursus  
anginae ordinarius.

Euentus. monetur celeritor, et  
qua ordinarium cursum seruat & uel  
& debet finitur et sole uel supplicari  
uole dissipari. si exterior tendat bonum  
est. Indicit e. coctionem et naturae uiri.

## Caput 22. De Tabe

tabes

Tabes est exsiccatio pulmonum  
qua sensum umoratum corpus li:  
quescit.

Causa. Vena pulmonis et pericardii facit vena pul-  
monis & pericardii  
quod causa phthiseos est continens monis & pericardii  
erunt vel ab extensis vel internis  
causis.

Externis ut catarho & Copit. plaz.  
pso; ex pure post anginam, plor. a catarho ex  
angina, purpura monia, vel etiam ex pure ab angina  
hydrope ipsius pectoris. Et catarho plumbis purpura  
a. aut pectoris hydrope non ita facile hydrope.  
sit, faciliter a. et etissime ex pure,  
et si quis ex tumpmate laboret, et  
pulmo horrens in part. per 30 dies  
dissolventur quasi, et in partes decidit,  
ut anatoma constat. Dende potest  
fieri, ex uernibus et calculo sed rari, raro ex bronchis  
sunt.

Internis. Cum pulmo laborat vel a pulmone labo-  
rato vel phlegmono, vel ade- rante exsipulati-  
mate, quod idem est ac crudum tur: etc. vel anomis-  
berculum: vel cum uena aut arteria mala pulmonis.  
disfrumpatur exsipulos.

Erysipelas et phlegmone ab ijsim  
causis proueniunt ac in angina  
explicariuntur. optimè tamen praes-  
tat usus tabaci.

Cuius urina tincta est ab usu  
Tabaci, is certe Erysipelate  
pulmonis laborabit.

Causa frequentior  
vis sunt arctiores  
ob animi paternata  
vel uitium confor-  
matiōnis

Causa a quā Ego credo frequen-  
tissimam vis arctioris sunt ob am-  
plius affectus vel uitium conformatio-  
nis, unde deprimitur thorax: sanguis  
et hume ob constructos pulmones pro-  
pulsus liberò perire non potest;  
unde restagnat ibi, et ulcerū gignit.

Alii natura frigidi sunt, non ita  
facili corrumpuntur phthisi; quia  
cor in iis non ita potenter possit

Oedema item ob  
humores fugider.  
congestionum

Oedema contingit propter congesti-  
onem, vel fluxionem. Congestio fit  
ob frigus extermens dum e. pulmo  
refrigeratus non assunit suum ali-  
mentum, gignit inibi ulcerū. Tumor

(151)

Tumor hic tarde ad matutinatem per  
uenit, adeo ut ad 5 vel 6 septuaginas  
extendatur.

Tuberculum crudum potest esse ma-  
gnum dorsi pugni.

Signa pathognomonica sunt febris signa sunt  
continua, que exacerbatur post febris continua  
assumptionem ciborum: verum magis quā maximū post  
in aliis febribus; Corpus emaciatum, assumptionem ciborum  
tussis, purulenta excretio.  
Quamvis hæc febris sit continua, tac- Corpus magis,  
men mani uix agnoscere potest; atq; tussis, cum puru-  
post magnam puris excretionem fe-  
bris aliquando doceuit, et quasi sani  
videtur.

Febris non tantum magis exacerbatur, uerum diutius, et ut plurimum  
apud nos, circa horam quartam.

Tussis quandoque siccæ, quandoque hu- pus dignosritur  
mida. Ius non cognoscitur nisi ex Lector et  
quætori inspectione, habitusque has substantiæ in  
conditione. I. quod materia eius

(1527)

ualeat sit levata, cohæreatque, et totū  
fundata pulvis oppletat. 2. Etsi ita  
cohæreat, inæqualiter tamen habet con-  
stitutionem, et quasi ut filigae di-  
cimus, gemaculiert.

Quod a qua tho: Cum trahulenta materia, qua  
raris pte problemat tussi reicitur, causans phthisim,  
difficile est dictu necessario ex thorace pronominat;  
i qua tamen parte difficile est  
cognitu. Et pleura non esse appa-  
ret ex eo quod non continuo ut  
in phthisicis aliquid fluat, sed post  
septem, aut octo dies definit: an  
e pericardio, uix dixerim. affirmat  
tamen D. de Mayerne: sed si contin-  
gat, casus ualde rarus est. Res-  
tat & ut materia hæcat uel in  
thorace, uel in pulmone, ubi uera  
phthisis fit. Si in thorace, radiorum  
quidem symptomata ac in tabe-  
rum ab ea differt, quod æ gri post  
expector.

Tabes.

expectorationem levamen percipi-  
ant, in uera a phthisi non item. Eupycema febricula  
Motus, si sit Eupycema, primo febri et tussis sequitur  
cula et tussis oritur, si non exere-  
atur materia, exacerbatur febi-  
cula. Si a Catarho, egris tussit  
unt, aliquando bene, si se habent,  
et tum rursus extussinunt: sin-  
uero Catarho et acrimonia adsit,  
et eger animi affectibus indulget,  
non facile sanatur; si uero non,  
non adeo periculose est uitium.

Si sit Erysipelas, aut phlegmone, Erysipelas, in  
primit latens dolor ingens, et ali: phlegmonem primit  
quanto innocua sunt symptomata latens dolor, febri  
ac in pleuride primo dicitur <sup>rule, tussis, & febribus</sup> habent <sup>candidum, & pallidum</sup>  
febriculam, et postea mgraues-  
cit, dimid tussiunt, tunc candi-  
da efficiunt, tum hymenosa, postea  
lenta, ult.

postea lenta, ultimo putida, atq;  
tum denum vero tabidi fiunt.  
Si ab arteria pulmonis disrupta,  
quod contingit ob laborem, clausio-  
rem, venarem, vim copiam tales  
sanguinis sputo laborant; et bene  
est si tenui aut quadratum spacio  
curatur: si vero post illos dies  
redit sanguinis sputum, phthisici  
evidunt, et post secundum aut septem  
dies mori solent.

Cura tabis difficultis est, et pra-  
sortum in præcautione consistit.

Si ab empymate, statim aperi-  
endus thorax, quanvis periculorum  
id sit.

Si a catarrho sita ut asthma curab.  
Si ab hydrope pectoris, uena sectio  
est utilis. Hydrope enim thoraci  
alia ratio est, ac hypochondriacum,  
quia force oritur a sero calido,  
et tenui

blistera per refrigerante et humectante. 5. ista ventilans et impinguantibus ut pul-  
es latentes obstruere, hysper infusio, ualvula, formae latris et cypris, balneum latissimum,  
post quod pulles astur. 6. sagittaria cordata. Linaria hyper. Thellathina. 6. Rosmar-  
inus, Sideron, dagomer. 7. bliste Vespa, Cof, resinarum ueli, resina, pop. Infusibus.  
Diverso. portus et spina incingenda, linimenta yngripes cum aliis iugis et medicamentis.

Cura in sex adiumentis  
consistit. 1. in catarrhi  
sublatrone: de laetato in cap-  
di catarrho. 2. in Veneris cura  
zahent ubi Laudanum floris  
sulfurum obsoleti. 3. grana  
de Erglime, Lobelia, de hoc  
de lobulo, Lycium, resina, flori-  
sulfur. 4. gr. de allio fratre  
de suco pilosello, millyfolii,  
6. oppar. Resinam propria-  
nitatis, yngripes, saclarum  
resinam que sita laudanum  
pissim. Rad. Chion, Gunnera  
lent. de yngrip. singulis  
herbis cum cibis ueli.  
3. Sanguinum curare uel  
bonum offlare. alaudrum 2.  
4. Resinam et fumum q.  
fumum mat. et angusti. salvia  
5. lac ceterum cum origa-  
norum. 5. galena. 6. galls  
galls galli in ferme  
waterum. 4. Febris su-

et temui. purgatio hic commoda  
est, non expectoratio. Si a sanguinis spato, dabit fistula co-  
agulantibus; ut oleo utrioli, sul-  
phuris, succo citri cum saccharo.  
Hæc optima sunt remedia, si tuis-  
sis non sit magna. Si contra,  
dandum mollescatum cum sulphu-  
re; si persistet, opiate.

Si sit propter drysperas vel  
phlegmonem, uenosectio statim lar-  
giter instituenda, et rursus postiu-  
do uesperi; vendo dantur expecto-  
ranta ut Syrupus glycyrræ, ca-  
pillorum ueneris, Spiritus uini cū  
saccharo.

Crudum tuberculum difficulter cur-  
atur, et calida hic potius adhiben-  
tur, ut uinum hispanum, malua-  
ticum: et à minis calidis affit-

nendum

(156)

Pleuritis - abstineendum, quia sic oritur sibi  
et ardor, a Fugidio quia oritur  
Lipothymia, et prostratus appeti-  
tus. Optimo successu adhibetur  
omnium Lonicerae coctum cum dra-  
gata et semiss. florum Sulphuris  
sumptum manu et usque in quo sidi-  
f spatum 4, aut 5 Hopdomadum.

Contra Lipothymiam uix datur  
quod prodest, nisi iurum maluati-  
cum, si aeger ferat.

### C aput 23.

#### D e pleuritide.

Non dicitur pleuritis a pleura sed  
a pleuro, quod significat latus. quare  
cum dicimus pleuritidem, non statim  
intelligimus membranam illam sed la-  
toris affectionem.

Signum pathognomicum est late-  
ris dolor pectorius, febris continua  
tussis

tussis et respiratio difficultis. Pleuritis  
 Causa. cum sit dolor, pars sensibilis  
 debet esse affecta; sunt autem ex  
 membrana pulmonis, perostrum,  
 musculi intercostales. Deinde si in-  
 dum dolorem uolumus ad pleuritidem  
 referrere; mediastinum et pericardium.  
 Dolor hic ab interponitur quanvis  
 adit, febris non ortur, sed a solu-  
 tione continuo que consistit in tu-  
 more calido.

Est autem tumor hic triplo; vel  
 phlegmone, vel erysipelas, vel echy-  
 mosis; quia dantur spacia vacua.

Membranam pulmonis (questio enim  
 est an haec partes omnes haec sympto-  
 mata anti dicta producere ualeant)  
 haec symptoma inferno possit; hoc pa-  
 eto suadetur. Dolor puer torius in  
 ea dum sensibilis, ortum possit habere  
 nemo negabit. Cum tumorem ca-  
 pedum patiatur, febrem continuam

inducere

(1581)

Pleuritis inducere ualeat. Cum sit organum respirationis, facile tussis excitatur et respiratio difficultis, ut observauit platerus aliquis. prout etiam membranam hanc affici indicat hoc quod phthisis in initio ualeat de dolore lateris conqueruntur. quaro Credidimus hic frequentius contingere. pleura etiam possit affici (et si id platerus aliquis negat) ratio monstrat, quia cum habeat arterias, et eius substantia sit porosa, facile sanguis excedere et inflammationem parere potest; que madmodum in reliquis membris: periostium eodem modo afficitur ut pleura, sed ceteras partibus magis afficitur ectymosis. In mensulis etiam intercostalibus sit. sed

ibi

sed ibi omnia symptomata non adeo  
sorua. Mediastinum etiam affici-  
tur ut Observavit D. Heurnius  
in suis thesibus de pleuritide, quod  
ex dissectione Cadaveris apparuit.  
Pleuratum etiam possit affici no-  
taunt D. de Mayerne Medicus regis  
magna Britanniae. Sanguis sic tu-  
morem faciens vel est nucus vel  
biliosus raro pituitosus aut melan-  
cholicus. Ex contentis siccis non ar-  
gumenta laborant pleuritide, cuius  
dolor sub papilla sinistra existit.  
ratio eius rei uidetur esse, quia  
eo uirgent rami maxores uena  
arteriosae.

Cum uitium est in aliis partibus  
nra sunt arteria intercostalis,  
mammaria, thoracica, mediastini,

pericardii

pneumatis aliquando. At hunc sed rarius.

Causa quare talis humor talis  
vix in talen partem pellatur, est  
uel in humoris, vel in parte vel  
in mitiente. Humor talis est, vel  
ob copiam, vel ob calorem, vel  
temperatorem, quo inducunt larga  
vix potatio, caro hædina, angul-  
la &c.

In parte vix est: vel enim ap-  
erta vix est, vel constricta:  
constringitur facile per frigus, ap-  
ertur facile ob consuetam aperi-  
tionem per ~~frigus~~ a. cum circulatio  
per poros carius fiat, sanguis ibi  
detinetur; ut apparat in stucillis,  
quæ se hinc malo scopo obficiant  
propter subitem minis caloris et fu-  
goris mutationem.

Maurus.

Mouens est uel trahens uel pol-  
lens. pollens est cor ut in ani-  
mi affectibus patet. trahens est  
uel dolor uel calor partis.

Motus. primo dicitur locis fibrarior-  
um intermitens cum dolore late-  
ris. secundo non remittit fibras  
et omnia exacerbantur non ut  
in angina.

Signa. Tussis aliquando secca,  
aliquando humida. pulsus durus  
non est certum signum, quia a  
pleuritici qui multum sudant pul-  
sum mollem habent. Si in pul-  
mone malum haeret, sputum  
magis excrucitur quam si in  
pleura esset. Ex pleura etiam  
sputum pronominis potest, qui a

humor

humor ē parte humida transfu-  
dat; et apparet hoc indicio; si  
enim proximi ad pericostium in clun-  
fit ad profunditatem quatuor di-  
gitorum transversorum; quanto ma-  
gis per tenuem et minus <sup>crassam</sup> tenuem  
membranam. Quando tussis secca  
est, et sputi parum prodit. de plau-  
rā suspicio esse potest.

Percostii ac pleurae eadem ratio-  
est.

Si musculi intercostales sunt af-  
fetti, ad pressionem dolor exa-  
cerbatur.

Si in mediastino, in medio magis  
est dolor.

Si in pericardio maiorem calorē  
et dolorem adesset putamus ob cor-  
dis viciniam.

Signa

Signa humorum. a bilis-mazaror est dolor, a sanguine minor; humor, et difficultor respiratio.

Ex iunctus. si in pulmone, & aut 4 diebus finitur fere. ad salutem si tendat 1° dolor. 2° febris. 3° sputum. 4° et ultimum respirandi difficultas cessat. Cum in pleura est septimo aut octavo die proter propter ~~finitur~~ plorung, humor disrumpitur, ex quo continuo sanguis in thoracem influit, et expectoratur per foramina in pulmone existentia, ut in sectionibus humorum liquet. Vidi ergo qui sanguis octo aut quindecim diebus sanguinem expuebant.

Cum pleuritici de dolore totius latris conquerantur, difficile est *degenerare*

Pleuritis.

Degno scire an pars superior an inferior sit affecta: ut autem id sciamus; si in superiori parte uitum est, dolor est immensis circa claviculas, quia pleura illa annexa est; si in inferiore dolor est circa costas inferiores.

Pneumonia & pleuritis differt, ne quod sit in substantia pulmonis.

Cura praecipue consistit in uena sectione ad 3 xvi et post prandium ad 3 ix. Secundus die si non definet, purgandum leuitate: si in tum quidem, et cum secunda uena erit, adeo ut quinque fecare licet. Et si ne tum definet, sudore acidi de recto cardui benedicti et papaveris rhoados.

Si sit //

ri vel lenti, rancidi dantis apri, sano equi non castiati mag. scabios. affusione foliis cataplasma hib. Kaly radice alii alii ventre li. post de-

Cura consistit in  
1. humoris influente;  
sobillendo. 2. impediti  
respirandi. 3. doloris  
taudis, & fatus  
comprimenda. 5. res solle-  
zana. Veneris  
ergi, insperatis admissi-  
strando in Graeco  
affecti labiis. 2.  
Si mensis vel haemor-  
rhoides reponit supposi-  
tum: bona fata  
si tunc supposta rur  
e Graeco. Doleri somnol-  
ebat dolor ut rug-  
e albedo alveolus adi-  
stros Chamomili & C.  
Graffio rotundum. Com-  
muni: ab initio uiderunt  
non ag. pap. Rhodi. pul-  
tricall. absillan. rubi.  
mandibula. Lyc. p. fr. vel  
nitidum. simplic. 3. eni-  
ag. laud. mariae; vel sp. .  
michi non sp. Vini o. 3. sp.  
tart. 2f. - ag. pap. Rhodi.  
Dorsum percutientibus utendam  
et sponte fuscitatem. Non  
spurcias ut per papaverat.  
Loppa rora. Gyneph. Cardi-  
con. Laud. mariae, piase ha-

Si sit Empyema, topica et fo-  
menta sunt adhibenda, ex par-  
etaria et chierofolio. Sed optimum  
est opium. Ratione febris Ju-  
lapia danda. In metus Syrupi gly-  
cyrrhizae est hic commodus.

### C apit 24.

#### de asthmate.

Disspira est quando non possu-  
mus magnum facere respiratio-  
nem (quia tamen secundum na-  
turam fit) sed pro ea cogimus  
facere celerius.

Causa uel est in in respiratione,  
uel in organo, uel in uis-  
per quas fit respiratione.

Vix respiratione deficit quia spi-  
ritus

Disspiracione

efficit Vitem facient  
respiratorie, organis  
uel viar.

reflexibus spiritibus.

Asthma

animalibus vel in  
toto vel in parte

(1662).

49

Spiritus animalis in parte deficiunt : quod fit vel quia ipsi spiritus deficiunt in toto, vel in organo proprio impedimentum in uis, ut cum diaphragma conculcit (quod tamen rarius contingit quam vel gō putant) vel resolutur. Viscum in organo est vel in diaphragmate, vel in thorace, vel in pulmone. In diaphragmate est uiscum, vel quia premuntur, vel quia detrahuntur ; id est vel ab aliquo quod infra id est, vel ab aliisque quod supra id est. Quod infra id est et ipsum prouidit aut detrahit, est vel pars vel humor vel flatus. pars hoc facit cum sicut aut hepatis laborant tumore aut obstructione, unde contingit diaphragma.

Liver vel hepatis  
Laborantibus tu-  
moro.

diaphragma detrahit. Huc rifer quan- Asthma-  
do diaphragma premitur a factie ~~in~~  
in utero grandarium.

Humor ut aqua hydroptorum fla humore item flati-  
tu ut passim in Tympanis, suffo- etc.  
catione uterina, et dolore colico,  
sed raro admodum. Quod autem  
supra, solummodo humor est, ist. sq;  
omnis generis, pus &c. que omnia  
ibi decumbentia id prement.

In thorace uitium ut in pleuriti: a thorac affecto  
de, in pleura aliquaque partibus  
inveniatur, humor dolorifico existen-  
te; Unde cum motuum dolorem.  
Si costae ad se inveniunt arrederant,  
difficilior et minor erit respi-  
ratio. In gibbosis quoq; idem ac: a gibbo.  
edit.

In pulmone deniq; uitium est quan: a pulmone sham-  
do pulmo

~~ius~~ pulmo minor est quam debebat esse  
*iusto minor*, grabior a tuber- serundum naturam, nol grauior. Gra-  
 culo, raleculo etc. minor pulmo fit 1. quando deficiunt  
 vires et pulmo non accipit sangu-  
 nem quem debebat 2. quando re-  
 pleter est ut in peripneumonia,  
 tuberculo crudu, abscessu, uomica,  
 calculo etc.

a vijs respiratorijs  
 angustatis

In vijs haudem respirationis est  
 uitium, si ea angustentur vel con-  
 stipatione, vel obstructione vel op-  
 pressione. Constipatio fit a tuber-  
 culo crudu in pulmone. Obstrucio  
 (qua frequentissima causa est) fit  
 ab omni humoro, et prosectorum pitui-  
 ta eo nol è capite delappa ut  
 in catarrhis passim, vel eo per ar-  
 terias pulmonis effusa. præterea

<sup>a</sup>  
 tuberculo crudu  
 calculo etc.

etiam obstructio fit a causa exter-  
na ut videmus in Lapicidu, ne non  
a fumo hydrargyri vel denique a  
pulvere &c. fumo. Compressio  
fit a tumore in thorace existen-  
te.

Si proueniat a defectu spiritu-  
um et virium: sensus decrescit  
respiratio, et dibilitas totius cor-  
poris. Ex aliis signis fit manifesta  
et alia hanc quoquo causa ad sunt.

Si intus livers aut hepatis aut  
ab hydrope tympanitudo &c. suis  
signis de quibus postea, fit ma-  
nifesta. Si a catarcho, fore  
febricula praedit; ad est prope-  
tra titillatio circa Laryngem et  
louis tussicula, qua si continet,  
facit diffinaciam: Illa autem

a fumi venenatis

a tumor

a spiritus deficit

a livers aut he-  
patis virtute

a catarcho

Asthma.

(170)

91

matoria si non bibant agri, intra  
quatuor aut quinque dies concipi-  
tur et evadunt. Qui vero continuo  
dyspnoea laborant, sunt primo asth-  
matici, deinde orthopneici, qui non  
misi recta cervice respirare valent.

orthopneia labo-  
rantes materia pulmonib. impasta  
recta cervice com-  
modius respirent.

Orthopneici recta cervice spirant,  
ut situ tali commodior fiat respiratio.  
Commodior uero fit, nol quia thorax  
elevatione tunc est et pulmones non  
ita promuntur, nol quia materia  
tunc melius reficitur quam in de-  
cumbentibus.

Dyspnoea non est  
magnum malum  
intermittens

Euentus. Dyspnoea in principio non  
est magnum morbus, tractu vero  
temporis fit talis. Orthopnoea per-  
misi andat pulsus ccelosa admodum fit cum pulsus in-  
cipit intermitteret et est in Iuuenio

multo

multò periculis for quam in senectute.  
 Cura. si a materia in organum  
 respiratorium incidente corpus ca-  
 lidum plenumque sit; utna se-  
 cunda, et ualidum purgandum dandum;  
 postea adhibendum decoctum pe-  
 storale vel syrapi pectorales. at  
 tenuantes syrapi sunt Syrupus gly-  
 cyrrhiza de Hyssopo, de caulinibus,  
 Zedoaria cum melle; spiritus uini  
 cum saccharo. Intrassantes sunt  
 Syrupus de uiolis, de papaverio, de  
 althaea. Si asthma sit, et materia  
 adhuc influat, purgandum cardia  
 et maina; deinde damus purgantia  
 usitalia, ut Aloë et diaphœnicum:  
 mox expectorantia ut Syrupus nio-  
 larum; post siccamus caput fumi-  
 gium et eucuphis. Fontanellas in

binchus

Curat phleboto  
 uia purgantibus  
 syr. pectoralis.

Caput siccum habet  
 ut sufficiat et  
 eucuphis fonta-  
 nello et atom et  
 ordinis



yncope.

brachiis etiam ad mouere licet et  
vermina. Denique ergi patrum ad-  
modum bibant: semper habant al-  
num laxum.

## Caput 25

## De syncope.

Syncope est omnium uitium subi-  
tus Lapsus. i.e. animalium et  
uitalium et naturalium. Naturales  
ladi hoc est indicium, quod oriatur  
hydrophosis hoc est sidor frigidus,  
ob debilitatem partium seu reten-  
tivis facultatis. Lapsus autem ui-  
tium hoc ordinis contingit. primo  
deficiunt uitabes. tunc animales,  
postea naturales. Starum uitium  
lapsus est uel in effidente ut pro-  
pter intemperiem: uel in spiritibus.  
uitium in spiritibus est quando nou-

niciunt

venient ad partes; quod sit vel quando in intermedia via consumuntur, vel quando non mittuntur a sinistro cordis ventriculo in singulas partes.

Intermedia via consumuntur ratione sensibili ut non secessio vel auerisimile, vel nimia uenere, vel nimia excretione alui: aqua, puris, apostematis majoris evacuatione; vel insensibili, ut a dolore qui spiritus ualeo dissipat, ut tandem deficiant homines: ut uideris est in dolore nephriticis et vesica calcico.

Non mittuntur spiritus a sinistro cordis ventriculo quia deficit; deficit autem quia ibi non geruntur; quod contingit vel uicio materiae, vel efficientis: uicio materia si vel deficiat in toto proprii medicina etc. vel tandem in sinistro cordis ventriculo, idq; contingit

quando.

quando sanguis non potest per obstru-  
ctas pulmonum vias, ut in asthmati-  
co, vel per pulmones collapsos transfir-  
at dextro in sinistrum cordis uen-  
triculum, vel etiam spiritus in simi-  
lo deficit, quando deuter obstruitur  
sunt raro.

Itio efficiens contingit, cuiu-  
sudum umatum cordis vel dissipatur  
a nimio calore (ut aliquando in fe-  
bris ardentibus contingit) vel cor-  
ruuntur ab externa aliqua cau-  
sa ut uenientia, vel in corpore  
genita vel assumpta. vel interna  
ut humoribus uado uitosis et pia-  
uis, ut pure nimio transirent eorū,  
vel bilo porracia, erugiuosa aut  
glastra. Hinc referenda alia  
causa syncopae, quando in uirium  
humor biliosus aut pituitosus hardit-

in ore superiori ventriculi. Quare  
 hic debet esse quadam partium  
 communio. Communio autem est  
 vel quia materia transferitur ad  
 cor, vel quia propter partium com-  
 muniorum fit quadam immutatio.  
 propter materiam translatiōnēm non  
 uidetur esse, ut in fibulis appa-  
 ret in quibus saepe pituita aut  
 bilis in cordis haeret, nec tamen  
 illud produxit uitium. Quare alia  
 causa habesset debet quam ego  
 quidem puto esse hanc. Num bilis  
 vel pituita ibi compacta haerent,  
 nervus sextae coniugationis com-  
 primitur, qui etiam in cordis val-  
 uulas tendit (ita uideamus quodā  
 ab assumptione uisceros et lento  
 in syncopon membrorū) Compresso  
 ergo nro, valvula cordis non

bon?

Syncope.

bono potest moueri, unde uero cor  
potest bono sanguinem expellere,  
qui sanguis non retinetur sed re-  
gurgitat, ac inde materia defectus  
et syncope.

Syncope subito accedit, et si lenta  
est, dicitur exlysia, si grauior  
slipothymia. Si grauissima, syn-  
cope.

Hoc etiam obseruandum, quod  
qui syncope laborant forcè habent  
motum iomalsimum inordinationis  
oris et capitis: vnde apparet  
non omnino deficere simus viros.

Magnus morbus est et facile en-  
cat, ut frequenter reddit, nisi  
a racochymia in uenis existente  
ortum habeat.

Cura

Tractat. 1.

Cura. In paroxysmo agit se in qui <sup>palpitatio</sup>  
 eto, et omnia sunt soluta, ut hu- <sup>cordis</sup>  
 mores melius moueri possint. Si  
 a causa consumento, damus  
 aquam Cynamomi vel aquam in-  
 tae Matthiolae ad instaurandas vires.  
 Si anima copia sanguinis, neu-  
 fercho. si a contidentia aut obstruc-  
 tione pulmonis, morte praedita.

### Caput 26

#### de Cordis palpitatione.

**P**alpitatio est cordis motus  
 depravatus i.e. inordinatus vel  
 ordinatus quidem sed inveniens minus,  
 quo cor ad costas alludit. Et hic  
 motus contingit, ut pulsus magnus  
 qui casus rarus est: semper enim  
 fere

palpitatio cordis <sup>fusca</sup> inordinatus est.

Motus inordinatus est duplex, vel  
tremus qui tremor dicitur, vel gravis  
qui dicitur palpitatio in spacio. Motus  
autem inordinatus contingit vel quia  
volumula non constringuntur, vel  
quia ventriculi non adiungunt,  
vel (quod frequentissimum) quando  
non expellunt. Vitium in volumulis  
cognosci non possit. Vitium in adiun-  
gente vel in excessu vel in defectu.  
Ex defectu fit humor, ex excessu fit  
palpitatio in diastole: reportatur cum  
duplice palpitatio in diastole et sys-  
tole que hoc pacto dignosculur. In dia-  
stole cor uolumenter pulsat; arteria ne-  
re non item. In systole vero arteria  
ualde pulsat. Causa huius est copia  
aut tenuitas humoris que faciliter con-  
tingit in lumen aut utero. Ventriculi

non bene expellunt quia cordi aliquid molestum est, quod vel est exterius vel interius : exterius ut humor acer ac pungens in pericardio, item umerus, calculi etc. Internus ut humores, venae rati, acer, purulenti, umerus in ipsis ventriculus harentes.

Non omittenda hic est palpitatio ex tristitia qua omnium frequentissima est; adeo ut ex centonis decem non alia sit causa palpitacionem patientur. A tristitia itaq; hoc modo oritur: ut in ea omnes partes constringuntur, ita etiam constringitur pulmo, pulmo constrictus non admittit sanguinem ut prius, unde major copia romanet in dextro ventriculo cordis. Ex accidente continuo non sanguine et causa, oritur magna cordis dilatatio et parva constrictio.

primo

Primo solent pulsus esse major, deinde major concussio, hinc tremor; postea non possunt se mouere quin in palpitationem incidant, unde statim refidore dolent. Dende respiratio oritur difficultas, quia nimis potenter pellit air in pulmones; unde non ita liberis mouere possunt. Alij qui affectu eo liberari non possunt in hydroponem madiunt ita moriuntur. adeo tarda est, ut ea quo a tristitia oritur, spacio anni nimis ad statum perveniat, et non adeo tarde ad mortem definit: nam solent, cum daret, subito necare. Si vero ad facultatem definit, longo hoc fit tempore. Cura. systole sicut minima conuenit venæfictio larga in eis extra paroxysmum. Si in systole ab humoribus intiosis, extra paroxysmum purgantur.

aut

(1.81)

Affectus ventriculi  
aut corrugantur. In paroxysmo detur. Theriaca aut conserva melissa fumata et papillæ finis tæ applicata, nam sic humoribus motus additur et nitidus colorius cor transit.

Caput. 26 27.

### De affectibus ventriculi.

Functiones ventriculi tres sunt appetitus, concoctio et distributio. Appetitus abolescit, diminuitur vel deprauatur.

Abolescit vel quia deest humor uellicans, vel quia pars uellicationis non sentit. Deest humor uellicans cum non uenit debita copia, vel non debita qualitate prius contingit quando non debita quantitate generatur, ut cum ventriculus, aliquo

parte.

aliaeque partes non bene concoquunt  
et humorum acidum non bene segregantur, vel (hunc satis copiosus sit) pro-  
pterea obstructionem paucatatis, aut ob-  
exiguum pulsuum non satis venit ad  
ventriculum. Tertia qualitate de-  
ficit, si excomonitatis multis iisque  
temperis humoribus permiscatur spiri-  
tus acidus, unde eius uis infringitur,  
quod patet in carochymicis, excepta  
melaunchola: at melaunchola mihi  
nisi crassa est, ut per ora arteria-  
rum incidat cum spiritu aido in ven-  
triculum.

Pars uollicitationum non sentit quando  
humor oleosus vel putrefactus horret  
in orificio ventriculi: vel ob para-  
lysin et uitium in uenis: vel si sit  
minus laxatum superius orificium.  
Signa. Si sit ob defectum spiritus  
acidus.

acidi, adest cruditas. Si ab obstru-  
ctione pancreatis, durities ammod-  
eritatur, et feces alius tarda est.  
Si ob humoris in ventriculo, gra-  
uitas est in ventriculo, et cibis in-  
detur ascendor. Si propter oleosum  
et putrefactum quid, a fermentibus  
signa potuntur. Si sensus sit abo-  
litus in nervis, non curatur. In par-  
te quoque utrum est, si ventriculus  
ingestum contineat, nec sicut egredi,  
quod sit vel quia ventriculus unus  
est laxus, vel pylorus unus est au-  
gustus, vel humoris alio fluunt.

Cura. si sit ob adunctionem humor-  
is cacoethymici, aut harreat quid in  
ventriculo; purgandum aloë et aga-  
rico trichiscato, postea dentur que  
humorem acidum suppeditent, et ab

Styrontha

abstegentia ut oleum ~~mentriculi~~<sup>intestinoli</sup> aut  
sulphuris. Si his appetitus non  
redat, indicium est ventriculum  
debilitatum esse, et curare diffi-  
cile.

Appetitus auctus sunt  $\beta\delta\lambda$ , uos  
et fames canina. Hanc sequitur  
uox  $\beta\delta\lambda$  uos non item. Utiusq;  
causa est uel in humore uel in parte.  
In humore est cum acidus minus  
abundat, quod fit ob licetis obstruc-  
tionem inde regurgitat in ventri-  
culum, uel ob minima usum aido-  
rum, uel ob alios humoros aceris,  
ut bilis, pituitam salsam cum  
spiritu acido una in ventriculum  
incidentem; uel si spiritus acidus  
fit minus depravatus, ob excretum  
uel inodorum, unde ualde acris reddit.

in partibus

Est pars ventriculus, si nimis cito  
e ventriculo cibos pellatur; unde  
spiritus acidus in manu ventricu-  
lum uideatur; et hoc tumidas ferunt  
uel si pars sit irrigus sensibilis ut ex  
irrigo salsis et aceti resu, qui abra-  
dunt tunicarum crustas.

Quod in fame canina uocant, est,  
quod tales a bili aut pituita sal-  
sa famoscant, que cibos ita innutri-  
non possunt, unde gravato ventri-  
culo fet uomitus. in aliis ob  
copram spiritus acidu non uomit.

Affectus rarus est nisi sit a licentia.  
malum non est tam magnum nisi  
ingens cardialgia ad sit, que uenit  
a nollitione.

Cura. si a bilo let pituita salsa, dan-  
da purgantia et simul adstringentia

et Rhubarbi.

ut Rhubarbarum, Myrobalani, aut medicamentis purgantibus myrobalana adficiantur. Si ob luentiam curatur rosis conditis etc. ut Luentia. Si humor acidus sit nimis copiosus, aut acris, aut orificium ventriculi nimis sensibile, dannus capsum recorrentem, oua, Lactescia, pilulas de quinq; tragacanthum. Si a cardiologia, damus paucem testum in uno rubro maceratum.

Appetitus depravatus sunt malacia et fraca. Ratio huius appetitus depravati difficulter cognoscitur: fieri autem fit ex Imaginacione; et saepius appetunt unum rubrum et haec. Contingit ob praeos humores nollirantes orificium ventriculi; Et quidem semper appetunt contraria et si videantur similia, nam alii squalitatis

qualitatebus nollationi resistunt.  
Vno aut alterio die incepit, et nau-  
sea fit, precedit, et durat aliquandum.

Cura - Vena fœtida in grandis,  
et pueris, et adhibenda sunt que  
magnam vim habent hinc oris effi-  
caciaem frangenda ut opium.

Siquid est cum prævius vapor  
aut humor est in ventriculo, vel ipsi  
est minus sensibilis.

Cocchio abolutur vel immunitur vel  
depravatur. Aboluta concoctio est  
arrefacta, immunita est. Præservatione:  
facta: Depravata est cruditas indo:  
rileta. Immunitur cocchio quando  
cibus non satis liquescit vel concoqui:  
tur in ventriculo. 1. Non liquescit  
satis, quando non assimilatur potus do:  
bita copia. 2. Non concoquitur satis  
a ventriculo, quando humor acidus

non uenit satis magna copia ad ventriculum, vel ob nimiam copiam humoris addi, qua facit ut non satis diu moratur cibus in ventriculo.

Deinde etiam ob deficitum caloris et in temperatu frigidam et humida.

Intempore uenit vel cum spiritus deficiunt in toto, vel in ventriculo.

Si in toto deficiunt, signum est pressus debilis.

Primo in ventriculo deficiunt ob lesionem externam in ventriculo, ut ex cibo vel potu nimis frigido.

2 ab aliquo tumore vel materiai affluxu; quia de causa fit ut humoris intakes non adfluant. Excitatio etiam nullum facit.

Quando haec causa graues sunt, coctio est abolita, vel quando calor parvus est.

Signa

Signa 1. grauitas sentitur in ventri  
culo, tum nictus aceroris et flatis,  
excitatio aquosior est, aut noninitus,  
vixia sublimida est et aquosa.  
Exventus malum predecentem au-  
getur ut tandem in benteriam in-  
curat vel hydropeum.

Motus si ad salutem levati.

Cura uaria pro uarietate causa.  
si ab humore acido; sumenda que  
acida sunt, ut fulapium cum oleo  
nitiosi, sulphuris aut nitri.

Si ex nimio humore acido danda  
sunt obtundentia ut cibi crassi,  
casens rotens et lacticinia, spodium.

Si nimis aucta sit, ualide purgan-  
tibus: Si ob defectum caloris vi-  
num dandum, radices heleni, Cor-  
ticos aurantiorum, cyathorum; pul-  
uis cortex aurantiorum exiccatorum.

cateius

Exterius paucem assatum cum uno  
hispanico applicandum est.

Depravata concoctio est cruditas  
nigorulenta, que fit quando assatur  
quod in ventriculo coquitur.

Causa prima. quando potus est in-  
minutus. 2. quando cum humore  
acido simul incidet humor praeus  
in ventriculum, ut fit in febribus.

3. quando humor acidus non est bonus,  
quod fit quando habet aciditatem  
cum acrimonia ut in ijs qui biberunt  
multum uini adusti. Omnis genitus  
humor facit praesertim belosus qui  
excidit ex arteriis. 4ta Causa est  
quando unius calidus ventriculus, quod  
fit ob sanguinem calidiorum et tenaci-  
orum. 5. quando non excretur  
cibas

cibus; quod fit in ijs qui sunt in  
miso uoraces, vel nimium bibunt, ut  
et in ijs qui bibunt nimium et super-  
bibunt Circumcisam.

Motus pedetentium tandem laborant  
diarrhoea acri biliosa febricula  
adsumt defunt diarrhoea ad salutem  
ad mortem dysenteria vel febri.

Cura. si ob humorum acidum ui-  
teatum, pedetentium ~~inflatur~~ incendatur por-  
uenescerionem. Quando aliquid por-  
uisceatur, pro necessitate vel pur-  
gandum vel sudandum. Si calor  
adfit, hordenum cum glycyrrhiza  
et passulis conuertit. Si ex disten-  
tione difficultimum est curatu. nil  
tamen molius est quam conserva rofar-  
bus vel ter do die sumpta.

Capit. 28.

Capit. 28.

De affectibus Hepatis.

Concoctio hepatis vel abolitur  
ut in atrophia; vel minuitur ut  
in cachexia; vel depravatur ut  
in fetero ab hoc incipiemus. Mor-  
bus autem quem fetero sequitur est  
intemperie et quidem magna ut  
in febribus ardentibus et diuturnis  
annis pathematis.

Fetorus est color corporis  
mutatus, vel flamus vel viri-  
dis vel niger.

Sugitur flamo colore corpus a-  
bile: qua de re volunt quidam  
cubitare. Clementius in tractatu-

de febre-

de scholis humoristarum . pass . def .  
 cept . cap . 5 . pag . 205 . negat  
 a bile esse eo quod urina ictericor-  
 um non sit amara . Verum id ori-  
 ri credidimus quod biles saporem sal-  
 commixtus auferat , ut sapor orinatur  
 magis terrestris et astrigens , quam  
 vis flauedo etiam possit ab alia  
 causa oriri quam a bili .

Tingitur autem cutis bili nol que-  
 ibi generatur , nol que alibi gen-  
 erata eo uenit . Generari autem in  
 habitu corporis uix dixerim , Corre-  
 fens tamen id fieri posse assertit ut  
 humor quidam biliosus nol quid simile  
 ibi generetur ut testatur de populo  
 quoddam in Sardinia . Alibi ge-  
 nerata eo uenit , nol quid minima  
 generetur , nol gerita non extenuat .

minia generatur ob intemperium rati-  
liam hepatis, reuis, aut lunis.  
Vnde apparet uenim non esse quod  
semper in dextero latero tensionem  
aut grauitatem sentiant Ictericci. Se-  
cundo quando materia aphor est  
ut in bilore conuertatur, ut obſea  
et aromatica omnia. 3° ob uenem  
aut morbum vel iectum uipere. Genit-  
ta non bene exeruntur ob obſtructio-  
nem meatuum ut uasorum hepatis  
scilicet cystica gemella uifical & fellea,  
ductus choledochii vel uasis hepatici.  
Angustia horum meatuum fit vel  
a compressione ut a Scirro, vel ab  
obſtructione qua fit ab omni humore  
crasso proſertim a pituita, etiam a  
calculo vel coaſcentia quo rarius  
ut ab

Icterus

ut ab ipsa nativitate ut in infanticibus.  
 Icterus iuridio eadem ac flamus cau-  
 las agnouit nisi quod maior adsit  
 adustio; quod duplicitate contingit;  
 vel quia ita dum generatur fit. vel  
 diutius in corpore harenus tandem cu-  
 colorum adipiscitur.

Icterus inger (de cuius natura val-  
 de controvertetur apud authores) fit  
 vel a melancholia, vel a bilo ma-  
 gis adhuc adusta; raro tamen hoc  
 observatur. Cum autem a bilo ma-  
 gis iuridis apparat. Melancholia  
 haec non est naturalis sed praeterna-  
 turalis, a prava uentrituli concochi-  
 one aut intestinorum. Sic uideamus  
 quosdam excrementsa ingra deponere  
 prava concoctione aut inquinatione  
 non uero cultur a lioniis obstructi  
 quo<sup>m</sup>

Teterus

quod in his affectionibus secessum  
tum sanissimus doprohondatur.

Ex hac melancholia ouitur aqua-  
tus uiger dum per alium non ex-  
cavitur, uire per uenias lacteas  
totumq. corpus transffertur

Motus. Agri primo naufragat et  
conqueruntur de tensione; angustia  
per trit. et cordis ob continuum tran-  
sitem bilis; deinde in inguiimbus et  
oculis flauum quid apparere inci-  
pit: quando hoc duobus aut tribus  
viebus continuus maneat, urina se-  
bet esse magis tincta; sed in ar-  
cento fibri etiam tincta est, quare  
ut discimus animaduertes. Urina  
Teterorum luteolum immersum  
croco coloris tingunt, cum fibru-  
entium non item: exinde uero  
flavida

Icterus.

flaud mo totum corpus fædatur.  
Contingit hic calor etiam in febre  
maligna a veneno; uerum tum to-  
tum corpus non tingitur, sed max-  
imo ingeret et partes circa uascula  
Euentus. Icterus medicocis pe-  
rituli est. Si defuit, sudore solui-  
tur; si non, in hydroponem terminatur,  
si diu persistat. An uero icterus  
oriatur ex partium mino calore  
an ab obstructione hinc sentur, quod  
in obstructione feces aliuine non  
tinguntur, si a partium calore, tim-  
guntur maxime.

Cura. si à calore partium uena  
ferenda largitor. deinde largitur  
purgatio. Si ab obstructione omitten-  
da uena sectio et purgandus ualide  
Ahabaroro aut Gialappa, deinde  
aperturka

(198)

Icterus.

aperientia danda ut directum re-  
dicum Tamarisci, Sabinae.

In Ictero nigro usus serum ualdo  
conmodus; deinde hoc ager obseruat  
ne se lauet, aut prope ignem aut  
loco calido se contineat.

Cura Nigri Icteri: I. ualide purgan-  
dum cum confectione haniech; postea  
aperientia danda ex chalybe, tandem  
utrum purgandum, et sic sollet finiri.

Languet vehementer appetitus, nec  
curari potest, sed parum refert, nam  
sublata causa appetitus per se reddit.

## Caput 29.

De affectione hypochondriaca.

Affectio hypochondriaca est  
grauitas aut tensio in dextro

aut

aut sinistro hy pochondrio, cum  
melancholia, auxitate animi, fa-  
linatione et appetitu aucto vel  
prostrato.

Travitas aut tensio in dextro aut  
sinistro hy pochondrio semper per totum  
morbi decursum absunt; reliqua  
vero non semper: In initio enim ali-  
quando immo fero semper absunt. Trav-  
itas haec et tensio sunt etiam causa  
ceterorum malorum, orinunturq; ex  
causa aliqua replente dextrum aut  
sinistrum hypochondrium. Repletio  
illa istuc loci contingit vel in  
inservibus vel in canitatisbus. Vis-  
cera sunt aut hepatis aut lycy, aut  
ambo simul, replenturq; a crasso  
humore, pituita sc. aut melancholia.  
Si vero a fero in lycu aut bilo in  
hepati

Affectio hypochondriaca.

Hepato non sit por se, sed per acci-  
dens, dum enim ob harum partium  
obstructionem humoros restagnant,  
neq; bene expurgari possunt. Cau-  
tas in sinistro hypochondrio valde  
conspicua in Anatoma est, sita  
inter ventriculum, lumen, dia-  
phragma et omentum, in dextro  
non ita conspicua. Ego tamen cir-  
cidorim esse quod agri nonnum-  
quam conqueruntur de grauitate  
aut tensione paulo infra hepar,  
cum cavitatem dixerim esse in  
dextro hypochondrio intra hepar, re-  
uenit dextrum et coloy.

Cavitas he autem saltus sinistra  
(ut quibusdam placet) a natura  
ibi factae sunt, non tantum ut ex-  
crements recipiant, sed etiam ut  
inscera sibi unicum cederent possint  
dum mouentur.

propter.

propter hanc uiscerum repletionem,  
repletur etiam abdomen et intes-  
tina: Verum hoc prioris mali tan-  
tum uidetur esse symptoma: re-  
platio enim illa intestinorum et  
abdominis fit a flatu, cupus cau-  
sa infra dicitur.

Vidimus que pacto gravitas et  
tenuis oritur: noster ut inquirar-  
mus in hoc affectu melancholia  
causam que est obstructio lumen  
aut hepatis; ab hac enim obstruc-  
tione impeditur bona sanguinis  
fermentatio, unde crassior manet;  
a qua cum spiritus animales  
impuri generentur, accedit molan-  
helia.

Auditos animi oritur dum crassa  
illa materia ad cor uenit, que  
quando habet acrimoniam pulsus

oritur

Affectio hypochondr.

oritur color et contractus  
 appetitus aut fuis et prostratus  
 si non de causis oruntur gradu  
 tantum differentibus: ductus enim  
 oritur a lumen obstructione aut  
 arteria splenica: Tum e. humor  
 in ventriculum magis regurgitat  
 eo quod lumen non admittat unde  
 fames magna: Si uero obstrukcio  
 illa maior sit isti non tantum  
 arteriam splenicam sed etiam gas-  
 titam angustet, prostratus oritur  
 appetitus quia spiritus acidus ad  
 ventriculum non fecitur: Quod uero  
 prostratus appetitus ab estinuendi  
 obstructione fiat apparebit ex ap-  
 petitus reditu ex assumptione acidis.  
 Ex his etiam confidere licet mori-  
 bum multo majorum esse si pro-

stomach

prosternatur appetitus quam si au-  
geatur, quia obstructio multo ma-  
ior et perior inde et difficulter cu-  
ratur.

**S**alivatio etiam contingit ab  
obstructione utrum non plenaria  
qua cum crassa non excent, tenui  
facile elabitur, vel etiam quia ob-  
nentaculi debilitatem serum non  
bono cum chyle fermentatur  
unde facile rursus soterritur per  
consuetas partium vias, ut emulgen-  
tes superiores unde saliva, vel in-  
feriores unde urina copiosa.

**F**latus oriuntur a calore nimbo  
qui dum humores in celo aliisq; in-  
testinis existentes dissolunt attenu-  
atq; flatus producit, Calor autem  
hic major solito oritur ab humorū

majori

matori motu, motus deniq; a regularitate ob obstructa viscera:  
inde etiam ut plurimum, alio circa  
has partes inflammationes.

Motus. Egri primo tristitiam aliquam habent et parum molam-  
cholici sunt, tum de animi auxi-  
stati. Et humor conqueruntur:  
Hunc grauitas et tensio oritur  
præstissim quando comedunt. Tunc  
appetitus innius, tum salutatio,  
postea prostratus appetitus.

Si in hepato fuerit melancholia  
languor non est tam magna,  
nec appetitus adeo intensus, sed  
corpus magis perfunditur flaccidus  
et multo levior est affectio.

Motus ipsius est longus, et unum  
duo, aut tres annos durare potest,

qui vero

qui vero per se operniuum hoc morbo  
affliguntur non liberantur aut  
curantur. Raro, crisi fore lysis.  
Aliquando, tamen imperfecta ac-  
cedit crisis.

Cure. si minus adest appetitus  
abstinentia est ab apicentibus  
qua accidere habent, nam post  
illa assumpta prius se habent.  
at hic nato. prostant Fulapia  
apicentia ex alio ammoniaco  
aut chalybe, quia in ventreculo  
non facile ebulliunt. Si appetitus  
prostratus, optime datur spiritus  
sulphuris aut nitri, vel etiam pur-  
gans alio aut chalybe utriolo-  
to sed non inhamenter. Topica  
quoque applicanda ut Emplastum  
ex ammoniaco. Si his non cedat  
nominata danda, ut mercurius iute  
sed summa.

summa attensione ad grana quatuor  
aut sex quo modia dosis. Eg<sup>o</sup> non  
nunquam dedi ad unguli septem gra-  
na.

Sequitur atrophia. fit autem vel  
quia cibus non generatur vel penitus  
ad partem non distribuitur. Non ge-  
neratur quando nomen est, quia  
cibus perpetuo excurrent de vomitu  
autem egimus. Non distribuitur  
quando est obstructio venarum la-  
ctearum; qua de causa excurrent  
et per consequens non nutrit.

## Caput 30.

### De Hydropo.

Hydrops est humor adematofus  
aut totius corporis aut tantum ab-  
dominis aut plurimarum aliarum par-  
tium ut pedis et capitis. Si in pedo  
folum

solum non vocatur hydrops; sed si sic ~~Hydrops~~  
nihil in aliis quibusdam partibus chan-  
get.

Tumor hic cœdematosus pro materia  
agnoscit serum, pituitam, fatus, sero  
permixtos et sanguinem serosum.

In Anasarca maximum pituita abun-  
dat, in Ascite maximum serum aut  
sanguis serosus. In Tympanite fatus  
cum sero. Sanguis serosus dicitur, non  
tantum cum multum sero permixtum  
est, sed etiam qui propter levitatem  
extra uasa non concrevit.

Materia tumorum cœdematosum ge-  
nitrans, vel ibi in parte generatur,  
vel alibi generata eō uenit: In parti  
in qua est raro generatur; conti-  
git tamen ex contusionē, aut mordic-  
uata Emplastiorum applicatione.  
quibus opium iacet. Maa alibi ge-  
nita illuc fertur diversimode: ac  
primo

ac primo sanguis serofus gigantur  
qui non concipit ob calorom cum  
maxime fundentem, ut inde est in  
ardentibus et colligantibus febribus.  
Denuo pituita, serum, aut flatus ge-  
nerantur vel uitio materiae vel uit-  
io efficientis. Vitium est in ma-  
teria, si minima aqua copia assumat-  
tur ut in febribus ardentibus, tertiana,  
vel minimo decoctionum usq; ut in luc-  
uronica. Vitium efficientis; quando  
non bene permiscetur aquositas cibi  
et potus cum sanguine unde facili  
negocio fecerintur; vel quando probre  
permixta dissoluntur. Non bene per-  
missetur ob debilitatem s. frigiditatem  
ventriculi, hepatis, cordis, aut livers  
sed potissimum ventriculi idq; in auar-  
sarcia. Contra et bene permixta dis-  
soluntur

dissoluitur, quando sulphur in ipso sanguine consumitur, quod contingit ob minimum calorem, unde sol sero perniciem non potest, vel etiam dissipatur quando minus paucia copia salis est in sanguine. Hoc autem appareret ex eo quod omnes facilissime hydropticæ fiant, et siccato omnes curantur ut in Zeelandia. Unde Chymici vocant Hydroponem sol dissolutum; quod tamen non primario sed secundario fit; nimurum quia sulphur consumptum est. Tertio deinde Hydroponis oritur, ictio excretionis, quod contingit vel obstructione, vel minima ratione apertione, vel eorum uasorum, ut arteriibus obstructis serum exire non potest, sed remanere debet in corpore, sic per oscula arteriarum in abdomen accedit.

Locus

Locus quem Spigelius notat ubi  
hepar in omentum definit non  
mihi obseruari potuit. Materia  
autem per totum corpus fertur et  
exedit ex oculis arteriarum; pre-  
terea etiam humor peccans defluit per  
intervallia muscularum et cutis, post-  
quam illa ex arteriis exedit, et  
sic tumor sensim a capite ad infer-  
iores partes delabitur quod in au-  
safco contingit.

Hydropicorum sanguis interdum bonus  
est, nec serosus invenitur, quia serosa  
mava uenis et arteriis exedit.

Motus. Ordinarii incipit tumor  
exilis circa malleolum pedis, qui san-  
sus incrementum a suras aspergat,  
et non raro tumorem in inguine per-  
fonsferunt; et cum de nocte cubant

undutz

undantur sibi fani, tractu temporis  
nero ingraue fit malum, et si sit  
ana farca, incepit in facie etiam  
apparet tumor, et 3 aut 4 men-  
sibus ad perfectionem uenit. ali-  
quando autem est, si fiat ut sponte-  
uel per alium uel per urinam con-  
tingat excretio, et fani undantur  
sibi fani; rociduum tamen patiu-  
tur id q; saepius. Finit asthamati-  
ci duplice de causa uel quia ab  
domen magis oneratum alias par-  
tes premit; uel quia aliquid pec-  
cantis materia in abdomen effun-  
ditur [ datur etiam hydrops qui  
est tantum in genu qui fit a  
diuulsione et fieri a uenim huc  
usq; obseruatus est ]

prognos.

Piognosia. Morbus magnus est et difficulter curatur. Si autem ex potu fit, facile curatur et in initio non tamen plenè nam possit recedit. Nā stam uicem curatur sed rarius, & si recedit ut plurimum moriuntur patientes in gentem dolorum et respirandi difficultatem. In anasarcā agit plorūq. apoplexicus aut comatosus moritur.

Signa desperati hydroperis sunt, urina croca cum febricula continua.

Cura. Utendum purgatione ut Jalappa, gutta gomboia, sambucus. Tum roborandum ut dialaca, diacircuma, spicibus diametra et diarrhoeone abbatis. Et

tum iteranda purgatio; nam purgatione solvitur per vias  
ducere non possumus quia non  
sunt medicamenta aliquae mo-  
menti. Nec sudores valent sed  
inficatoria sunt bona, in femore  
sc. sed non possunt aperta diu-  
tenui. In tympano horifo-  
hum vel aqua spadana utilia  
sunt, quia sunt mediocreis temp-  
ramenti.

### Caput 31.

#### De dolore Colico.

**D**olor intestinorum duplex:  
vel crassorum, et dicitur colicus,  
vel tenuum, et dicitur Hiacus.  
Oritur autem dolor ex solutione  
continui, ut ab humore pungente

Dolor Colicus.

zarii petante: Inveniuntur tamen  
in intestinis calculi, frequenter  
a re rodente ut uoribus, pituita  
nitrea, acri et bilioso humore; fre-  
quentissime a re diuersenti, que  
haret uel in canitate uel intra  
duas tunicas. Si intra tunicas  
est uel tumor uel ecchymosis. Tu-  
mor est uel phlegmone, ~~ecchymosis~~ uel  
Erysipelas, rarissime scirrhos. Ecchy-  
mosis est matrix biliosa.

In canitate sunt flatus uel fa-  
ces distendentes. Haec causa sunt  
generales; accedamus ad particula-  
res. Primo Calculorum matrix  
est nucleus intestinalium minium  
Salsus qui a calore exiccatus  
in Lapideam duritatem perficit.

Praterea

Dolor Colicus

præterea etiam mucus facile in piz-  
tuitam nitream mutatur. Obser-  
vatum cum non solum in pituitam  
nitream sed in ipsum nitrum es-  
mutatum.

*Generantur autem flatus a ma-  
toria præcipue pituitosa a calo-  
re rarfacta. Fæces distendunt  
quando non excreuntur: non ex-  
creuntur vel propter coalescentiam,  
vel frequentissime ob constictio-  
nem; quando ab una parte fæces  
ab alia flatus distendunt: Dicim-  
non exrent ob tumorē, vel quia  
se multius intrant, postremo concur-  
sione.*

*Causa peccans si a calculo non  
facile cognoscitur.*

*Quando à reßione aut uermibus*

corum signa sunt .

Si a pituita nitrea sentiunt frigus,  
prostratus corum appetitus , uiro  
defecte; nulla excretio sive febre  
parum aut nihil exit; huic uirio  
maxime obnoxii sunt qui crapula  
dedicti sunt . Nihil habet peculi-  
arie sed semper in eodem statu  
permanet . Si a bile aut humore  
aci adest simul diarhea et hic  
facillimus est dolor colicus . Qua-  
do a phlegmone , erysipelate ,  
ecthymosi , dolor semper eodem est  
loco . Primum a solit hic fieri ri-  
gor modo febricula .

Si a fæbris distendentibus , ma-  
gnam percipiunt gravitatem que  
sensim maior fit . Si a flotu ; agri  
solent in initio emittere ructus

raro crepitus, quod tamen molius.  
 postea dolor vagus fit; qui si ue-  
 hementis fit, etiam rigores orinantur,  
 frequensq; ructus. Si vero dolor fit  
 circa inabilitum in intestino temni-  
 bus malum haaret, si vero circa  
 renes et pubem magnus ibi est dolor,  
 quod colon eo loci intorquatur.  
 Euentus affectus non ita adeo pen-  
 eulus, nisi sit ab obstructione intes-  
 timorum aut humor quo lethalia  
 sunt. Inter bona pituita uitiva  
 possima est.

Cura. si ab inflammatione, clypeolate,  
 aut oxyphosi urinam secamus, damus re-  
 frigerantia &c. si a materia pungente,  
 resistente, naliide purgandum, ut diagri-  
 do, diaphenico, Falappa. Si a corpus sit  
 debili purgamus mamma. Si materia sit  
 preparanda sit refrigerantibus et excrentibus  
 ut spodio, puluero Coralliorum, margaritar.

*Alii profluum.*

## Caput 52.

### De Alii proflumis.

*E*xcretio nimia est vel humoris utilis vel inutilis. Utilis, chyli et sanguinis. chyli dicitur cœliaca affection et Listeria; sanguinis dysenteria; inutilis diarrhoea dicitur.

Exit chylus quia uena lactea obstruunt et haec sola causa est cœliaca affectionis; sequentes vero Listeria; ut quando chylus est nimis crassus, ita ut uenae lacteas transire nequeat, quod contingit quanto pylorus est nimis laxus.

Connivitio nimis confestim fit idque ob nimam aciditatem hu-

*moris*

Alii profluvios

humoris acidi. 2. quando chylus  
minis acris expulsionem stimulat.

Acris autem est uel ibi goutus  
uel ob affluxum acrum humorum;  
unde cholera. 3. quando uitium est  
in intestinis quod duplex est, uel  
quando minis sunt sensibilia, unde  
statim transmittunt quod contingit  
aliquando post diarrhoeam ob ab-  
rasionem mucis, uel quando non  
contrahuntur intestina. Cæliaca  
affectio ualde rara, Lientrica  
frequentius contingit.

Motus. prius ægi solutionem  
habent leuem et bis die exercent,  
postea ter aut quater: ad summi  
plexos. Interea bene comedunt et  
dormiunt; et quemadmodum incipit

ita

# Diarrhaeæ

ita definiunt. Tempus durationis definiri facile non potest quia varium.

Prognosis. morbus magnus curatu difficulter presertim in debilibus : praececum etiam adfert hydroper.

Cura. Sicuterius vulgaris si Louis sit est conscientia rofarum cum eroco mortis. Sed potius dandum est opium in tanta quantitate ut non dicte dormiant; idq; per mensum faciendum.

## Caput. 33.

### De diarrhaeâ.

Diarrhaeâ est excretio humoris excrementitii, non sanguinis : quod autem aliquando sanguinea fœces videantur, est quod ægri ha-

morboi dibus

hæmorrhoidibus simul laborent, ut  
 sic sanguis in recto intestino pri-  
 us fecibus aggrediatur. Quod vero  
 sanguis ueniat ex hæmorrhoidib,  
 hinc animaduertitur quod sanguis  
 etiam ante excretionem exeat, it  
 quia sanguis fecibus non permisce-  
 tur. Vel humores illi excremen-  
 titii sunt omnis generis uel serum  
 sanguineum et tum dicitur hepatico  
 diarrhoea: uel feces tantum  
 et tum fæcalis dicitur. Exeruntur  
 etiam pituita, bilis, melancholia.  
 Humores illi uel in ventriculo  
 uel in intestinis generantur, uel  
 aliunde eo ueniunt. His generantur  
 ob ualde prauam coctionem, uel  
 quando uermes sunt in intestinis;  
 alibi

Diarrhoea.

alibi generantur et aliunde accidunt  
profectim ex genere uenoso: nec  
eradicatum ex cerebro tantum mat-  
ruam profluere ut inde diarrhoea  
possit sequi.

Motus. prius die aliquoties exer-  
cunt, postea frequentius, ino nicias  
uno die; que exercitio exacerbatur  
vel quando si mouent vel quan-  
tum. In seculum sumunt, aut carnem reca-  
tem: tandem definet in Tuncino. qua-  
lis sit humor uidetur ex extreme  
tis.

Prognosis. diarrhoea non ita adeo  
periculosa est, nisi definet in dys-  
enteriam.

Cura. purgandum et hababar ad  
3*ij*. vel *ij.ij.s.* tum si humores fer-  
mentant uena letatim tum refriger-

andum

refugrandum. tum sterum purgandum non acribus medicamentis. Tum adstringendum eroco ♂, sprodio, detecto foliorum querens.

## Caput 34.

### De dysenteria

Dysenteria est excretio alii cum febri, toruibus, et sanguine.

Causa. Sanguis excretur quia uas aliquis apertio facta est ex ulcere; unde et tormenta, et febris oritur. Viscus hoc fit uel uitio humoris, uel uitio partis. Utio humoris quando innis est acer. 2. quando innis est lentus, si interfractar plies intestinorum. In parte est uitium, quia abrasa innivit intestina et debilita.

# Dysenteria

(224)

debilia, ita ut facile lassantur. 2.  
propter vermes, aut calculos qui ibi  
dissessionem faciunt. 3. ob inflammationem  
aut intestinorum Erysipelas, quibus  
disruptis dysenteria oritur; que quoq;  
causa frequentissima.

Motus. 1. incipit febris cum dolore  
intestinorum et rigore indiggit, tunc  
aggravantur praesertim a noctu ita  
ut quater exercentur.

Excrementsa hoc ordine excernuntur:  
1. mucus intestinorum abrasus; abraditur  
a. ab humore acer, vel quia quasi  
fermentatur, et concresat chylus, et  
sanguis quo talcum materialm præbent;  
et hic est primus gradus. 2. cum ra-  
menta intestinorum excernuntur. 3. cu-  
caruncula.

Prognosis. magnum malum est et  
difficil-

## Dysenteria.

difficile curatu quando uero malignas abest durat 24 septimanas, nisi a febre aliisq; curatur eger.

Si dysenteria est in crassioribus intestinis curatur clyster et lactum galorum dulcium.

Primo purgandum et habarbaro postea statim astringendum conserva rosarii croco martis opio etc. Si tormenta superueniant umbilico omni impouendu.

Tarda alii defectio est quae feces et cibi reliqua raro nec pro assumptionum ratione descendunt. Causa est vel defectus bilis vel exiccatio fecum a calore vel obstructio intestinalium quod frequentissimum.

Tenesmus est nichilens et manus egredi cupiditas.

Causa est pungens acciq; humor, qui non recto

qui non recta sed per anfractus,  
in intestina in quadam dilatus  
et inflexus ea exilicat et acimo-  
nia rodit. Is autem est vel bils  
flava vel altra vel pituita salsa.  
haec et hoc materia ad intestinum  
rectum idonea exalcerat.

Cura. Lauamus lach et postea im-  
ponimus unguentum populeum. Argentis  
niam dicant in clystero vel uno sum-  
piente hanc affectionem sanare.

### Caput 35

de lumbricis

Vermes generantur in omnibus corpo-  
ris nostri partibus tam internis quam  
externis, praecipue tamen in intermis.  
Eorum genera varia sunt tam in figu-  
ra quam colore. Considerantur tan-  
tem apud Medicos fieri haec tria. Lau-

Lumbrici, vermes lati, et ascarides. Lumbrici  
 Lumbrici sunt vermes rotundi et magni.  
 lati sunt duorum generum; vel lati  
 aequaliter instar fascia, vel per varias  
 partes inter se concreta ut semina cui-  
 curbita; qui tamen singuli sunt vermes  
 sibi mutuo adhaesentes, atque hi pri-  
 oribus sunt frequentiores. Ascarides  
 sunt parvi, rotundi; quales in capo  
 generantur.

*metem. maa* H. orum materia est humor ali-  
 mentarius vel excrementarius. ali-  
 mentarius ut chylus, si paucus sit  
 impotior, unde et in ipso ventriculo  
 generantur; vel sanguis ut in tumor-  
 ibus phlegmonosis, unde est. Excre-  
 mentarius et quadam levior ut  
 pietuta que quidem causa est fro-  
 fecis alium quotissima. 2. alii feces ut in  
 Biles facibus bubulis observari licet. 3.  
 biliosa materia sed rarus: obser-  
 vamus

obseruamus tam non in caribus uer-  
mes undique siles circumdatos.  
Quomodo autem ex humoribus  
uermes generentur, dictu satis  
difficilis est. Inter uarias opinio-  
nes probabilior uidetur haec; quod  
in ipsa materia scirri, aliquod  
uernum latrat, quod a calore  
in actum deductum uerme pre-  
ducat. Propter has causas addi-  
quod ueruus uermem generet ut  
obseruat Hortulanus.

Notus. In initio parvo adest fe-  
bricula, priuunt naros. Et infan-  
tes qui his maxime corripuntur,  
uel ualde sunt gulosi vel prostra-  
to appetitu et insomnis infistan-  
tur: postea de dolore uentris ac  
rosione incipiunt conqueri, quod de  
Lumbricis

Lumbrici maxime intelligendum,  
 unde dolor fit ventre, postea  
 ad ventriculum repunt, reddunt,  
 et appetitum magnum excitant.  
 Quando materia sursum urget, exi-  
 tatur tussicula, et dolor aliquando  
 ut pleuritidum, ab aceru materia  
 partes thoracis pungente. ad na-  
 res si difficitur ex pruriunt, oculi  
 scintillant, facies aliquando  
 rubet, aliquando pallet. Insomnia  
 turbulentia et motus tumultuosi pre-  
 sentia in febre. Hoc symptomata  
 si persisterent, febrem quasi pesti-  
 lentiam producunt. Dissimilat excre-  
 tione. Fascia corpus sanguidum  
 et faecileum reddunt et aliis  
 plorung; ad stricker est. In ofca-  
 ribus pruriens adest in ano.

Lumbrici

Suspirii

Lumbrici

a fasciis difficultissimi morbus curatur.

Cura Longorum. I. purgandum  
deinde danda qua uenies eruant ut  
pulueres sautorici, hydromel, uinum  
hispanicum, mercurius dulcis. No-  
cant expurgantq; simul aloë et  
cocythi. Latii expurgantur sp.  
cubus diacanthum, et diaturbiti  
si singulis septim annis bis iij<sup>o</sup> purgi-  
mus. Ascarides curantur si spongia  
lacte imbuta vel mollo (quod mo-  
lins) supponatur in intestino recto si.  
ano: vel si fiat suppositorium ex  
cassia; nam ei adhaerent, et sic ex-  
purgantur.

### Caput 36.

De haemorrhoidibus.

Haemorrhoides nihil aliud sunt quam  
varices

varices uenarum am: varix autem  
est uena aperta seu potius immo-  
dice dilatata. Dilatatur autem  
uena uel quia sanguis preter modum  
crassus est, uel ob vim illatam uo-  
ris, que fit ex suppositiis et chyli-  
bus frequenter adhibitis.

A sanguine crasso contingit varix  
in anis, quia sanguis ibi dispersus  
non bene circulari potest unde a  
novo affluente sanguine propellitur  
et sic venam dilatat. Quod autem  
hoc in aliis partibus ita frequenter  
non contingat, causa est quia in  
no hemorroidales omnium uenar-  
rum paucissimas habent anastomosis.  
unde longo ductu uofici debet auto-  
quam possit circulari.

At in illatâ, ut a sphincter an  
nervoso sit, unde humoris illuc  
quasi trahuntur.

Nota. Inutiliter speramus uenâ  
hemorrhoidales ut per eas molan-  
cholia evanescatur, quia per eas molan-  
cholicus humor non extirpatur. nā  
quamvis primò molancholicus aliquis  
exit tamen statim bonus arteriosus  
tantum sequitur; at proinde uil-  
magis proficit ac si alia uena se-  
cetur. adde quod uena haemorrhoidalis  
difficiliter claudatur.

Hemorrhoidales sunt vel interne  
vel externe: Internae sunt in ani  
capacitate; ubi cum ab humoris  
affluente inflammatio atq[ue] ita  
ulcus fit, festuca eritur.

Motus. I. in ansa periretis, tum  
dolor et inflammatio fit. Si uena  
magna

magna dilatatur, oritur fucus.

et maxima.

Euentus. Periculum non habet nisi quando minimum aperiuntur et sic plus effluit; unde aliquando hydrops supervenit.

Mimis parum fluisse haemorrhoides non possunt.

Cura: repellere oportet refrigerantibus et astrigentibus ut iuguento populeo cum alumino mixto.

Si sanguis abundat in corpore, venefactio imporanda. Si ab hunc morbo malum follico, purgatio perficit. Non autem suht haemorrhoides aperienda.

### Caput 37

#### de Nephritide.

Calculi in omnibus corporis nostrum partibus

partibus generari possunt, prae-  
pno tamoni in renibus et nefis.  
Causa generantur autem vel  
vitio materiae vel effluentis.  
materia disposita dicitur uulgò  
crassa et lenta quod aerum  
si modo sano sensu accipiatur  
se. si per materiam lentam  
et crassam intelligatur mate-  
ria salsa qua oliquid terrenū  
admixtum habet: Lentor e.  
Sic salē non est; sal enim  
componit. Materia talis uel  
generatur in corpore uel ex-  
tra corpori effunditur. Extra  
effunditur ut in ostreis. et mi-  
tilis: Frequentissime autem  
generatur ex cibo qui in cor-  
poris

Corpori ita dispositus est. Generatur ex cibo quando minimum funditur et deluitur sal ita ut per uenae lacteas transeat, alias per alium excrevitur. Disoluta ita sal obicit calorem et humiditatem ventriculi. 2. quando materia salsa aquæ et terra permixta, minus exiccatur a calidore cordi, reni, hepatis. Materia autem hæc in calculum excrevit non exicatione sola, sed ui salis qui in se continet vim condensandi et conglutinandi: ut uidetur est in ostreorum testis et calcariorum ex testis paratur. Causa adiuvans est calor et angustia renum et ureterum; quia sal et aqua

et aqua continuo debent trans-  
colari.

Simili ratione calculus in ue-  
sica generatur qui vel primo per  
emissionem generari incipit; cum  
sero expusso aliquid in vesica  
retinetur quod paulatim concipi-  
et; vel secundario quando lapil-  
lus ex renibus in vesicam defeu-  
dit, et postea affluxu materiae  
accrescit.

Motus. I. in calculo renum,  
aliquem dolorem sentient in  
latere et difficultatem in mi-  
ctione; postea haec sequuntur  
symptomata: dolor fixus, no-  
nitus qui ex commissione mem-  
brorum et rerum nempe peritonaei  
cum ventriculo fit; assumptio  
tamen cibo cessat, deinde tensio  
in membro.

membro nūcli, stupor in crure et  
dolor intolerabilis, præsertim  
quando calculus ad pessimum  
venit, et ubi ureter intrat  
vesicam, cum pedes fugient, hæc  
symptoma facile oriuntur in  
calculosis.

Symptoma autem prīus sunt  
grauora, postea nūtiora, quia  
partes sensim dilatantur, adeo ut  
calculi pisi magnitudine possint  
exerci sive magno dolore.

In calculo vesice et quasi strā-  
guriam sentiunt, postea dolor  
exacerbatur, qui post mictionem  
est maximus; ratio hujus est,  
quia in excretione infixa con-  
structa collidit ad calculi partes.

In urinis ramenta conspicui-  
tur et senti-

et lento adest, adeo ut humor  
ad tres cubitos se se extendens  
cohaerere possit. Calculi in fun-  
do matulae aliquando inveniuntur  
qui tamen ex corpore excisi non  
sunt, sed inibi generati. Ut au-  
tem scias an ex corpore vener-  
eum sint per Pintorum inveniendū.  
Symptomata in calculo uisice  
aliquando cessant, cum calculi  
uisice membrana accrescit.

Euentus. Qui Nephritidis labo-  
rant, dolore extinguntur: qui  
visice calculo vel dolore vel con-  
vulsu motu.

Cura Nephritidis. semel et  
iterum in mense purgandunt; pos-  
ter danda sunt que dissoluntur, ut  
butyrum cum saccharo et succe-  
ctii

erit: tum postea danda sunt di-  
uretica, sed non minus saepè, ut  
sunt oculi caueri, semen nym-  
phae, sal fabarum, sacrificia-  
gia, terebinthinae 33 vel 31.

tu paroxysmo purgandus est al-  
ius: si haec non succedant, uite  
sunt amplianda ut petroselinio,  
cherfolio, apio, Emplastrum  
cucurbitinum cum uite appo-  
nendum est parti pudenda. Si le-  
niendum sit fiat oleo amygdalino  
dulci cum Juniperi qui  
destrahunt.

+ magisterio hanc.  
rotulati. ocalor.  
Cenosi Lap. Ind.  
Egentia Cristall.  
Lap. nephrities  
aq. Vitæ Juniperi  
etc.

+ Inniuinitur autem calculus, spi-  
ritu salis, nitri, semine dauci:  
cortices sambuci applicandi sunt  
pubi:

Lemines

leminus symptomata oleo amygdalorum dulcium, mercurio: vel granae aenacum intro per penum mittitur. Decoctum malum interius exhibetur. Si illa non suauant, seessione extrahitur; quod bene Lithotomi faciunt. Sed unum est monendum quod Lapidem non fortiter promant ad anteriores, quia ex illa pressura ut plurimum insequitur inflamatio. Vbi extractus est calculus, fluxus est sistendus ex decoctione seminum quatuor frigidorum matorum.

Diuretica non sunt danda, quia nimis effluxus faciet ut ita postea faciliter curari non possit.

s. autem

Si autem post curam maneat  
stibatio, mercurius precipitatus  
impinguatur, quo iterum aperitur,  
et caro mollior redditur, et tum  
iterum uiuitur, et sic curatur.

## Caput 3<sup>o</sup>.

### de gonorrhœa.

Gonorrhœa est involuntarium  
seminis effluvium tam in viris  
quam in mulieribus, saepius tan-  
men in mulieribus.

Semen effluit vel uitio seminis,  
vel uitio partis. Ut in seminis,  
quando nimis est copiosum. Ni-  
mis copiosum fit ex uictu deli-  
cato, aut quando non exercitatur,  
quam in ipsa etate copiose  
generatur.

2. quando nimis est acris, qua  
acrimonia vel est in excessu  
qualitatum, vel in virulentia.  
Quando est ab excessu quali-  
tatum, vel calidius, vel acris,  
vel salsius existit; cum orbit  
eju nimio piponis, salis, siuapie,  
nimio uino, incubatione in dorso,  
equitatione. 3. Quando semen  
nimis est aquosum quod contine  
ob debilitatas partes genitricis.  
Debilitantur autem a frigore,  
nimia uenere, proscriptim quando  
quis est ebrius. Virulentum se-  
men est ex suo uenero, et  
tum uocatur gonorrhœa virulenta.  
Vitio partium, quando nimis sunt  
aperta, nimis aperte sunt quando  
mentis in

Gonorrhœa

in urothram vires sunt aperte pa-  
tuli vel exultorati, magis patet  
a copia seminis partes distenden-  
tes. 2. a gonorrhœa uirilenta  
a qua quoque sit exultatio in  
illis partibus. Has omnes causas  
promovet libido, somnium aut fina-  
gatio ueneria.

An febris sit uirulentum nide  
cognoscatur quod uidetur afflictor  
vel uiri vel flavo colore, et  
major etiam adest ardor. Luidam  
non addunt testiginem, que quidem  
est sed non tanta. An sit ex  
copia aut ex ardore cognoscimus  
ex ardore lumborum et partium  
genitalium. An ex meatus  
apertione, an aquositate, ex pro-  
gressis licet iudicari.

post

Post primam septimanam solet  
stillare, si sit a gonorrhœa viru-  
lenta, ac facile exalcerat incau-  
cunarium. Sua sponte aliquando  
desinit, sed minima occasione redit,  
ut quando libunt uinum. In ar-  
dore, aut copia feminis tentio  
primum ortur, et hoc uitium  
longo tempore sepe durat, ut ad  
duodecim vel viginti annos sepe  
durat. Et in hoc malo proscriptus  
ab imaginatione effluit semen;  
quando a partu in debilitate perfe-  
tuo stillat, et hoc difficulter cura-  
tur. E ventre. Malum est pi-  
riculosum praesertim si creatur a  
debilitate. Mulieris qua laborant  
hoc malo, primo sunt melancho-  
licæ, et magno capitis dolori sunt  
obnoxiae. Viri primo emaciantur

... tum mil.



tum melancholici, postea hydrope-  
ci sunt.

Cura. In gonorrhœa virulenta  
nihil est commodius cassia et  
terebinthina, vel cassia sola cu-  
m eis seminibus. Si ob seminis  
copious, dieta et uenefactione et  
præcaudum. Potus corum sit  
serum lactis, quod ualde conmo-  
duit. Si propter lumborum ca-  
lorem, inunctionibus frigidis est  
utendum, aut plumbi lamina alli-  
ganda. Si a decubitu supino,  
in lateri dormiendum. Ut auto-  
cubitione in lateri affixant,  
pila dorso annexatur, vel chiam  
descubunt in corio quod refuge-  
rat lumbos.

### Caput 39.

### De I Schuria.

Ishuria est excretio urinae abo-  
lita. Contingit hoc vel quia uri-  
na ad uiscera non uenit, vel quia  
ubi uenit, non excretur. Non  
uenit quia excretur alio, ut se-  
pe in hydrope contingit. 2. Do-  
cenes sunt a calculo obstructi,  
vel a putida, sanguine, puri, et  
sordibus. Dico sordibus; quia haec  
causa raro sola obstruunt, sed  
aliquid quasi lumen illis perni-  
scetur. Obstructio autem illa  
frequentior est in uretris. Ubi  
urina uenit ad uiscera, non  
excretur, si per umbilicum exer-  
natur. 2. quando ipsa uisca est  
debilior; est autem talis; quando  
in ipsam non influunt spiritus  
ita ut quasi uisca paroxysmori-  
atur. 3. Quod habet Galenus quando  
<sub>uisca</sub>

quando uisca est stupida et non  
sensit. &c. Si convulsione labor-  
ret coenæ uisca, aut obstrua-  
tur a calculo, puer, pituita. 5.  
quando in ipso cruce caruncula  
succedit, aut in meatus urinario,  
ut contingat in uirulenta gonor-  
rhœa. Hæ causæ si sunt minoris,  
imminutam uiuæ excretionem pro-  
ducunt.

Motus. Si ex Hydrope, pide-  
tentim urina excretio immittitur;  
aliquando tamen et multum exer-  
cunt, quando crassior fit, nec se-  
cum transfrandi potest in habitum  
corporis. Vel quando partes molles  
tiam a sero sentientes uiuæ ma-  
teriam in uasa libera propollunt,  
ex quibus ad tenes pollitus. a

sordibus

a sordibus aut paralysi subito fit,  
a caruncula, sensim.

In mulieribus contingit aliquando  
urithram compressam esse ab uni-  
verso utero: deinceps dorso in cum-  
bant, statim urina magna copia  
profluit.

Euentus Ischurie. A quacunque  
causa, grande malum est, non  
quod ad unum dico extenditur.  
Quando per friduum duravit, nou-  
mat pericolo, facile enim in  
febris incidunt ob sal dissolutum  
a copia humoris serosi, unde fer-  
moriuntur. Si in vesica sit, ea  
nudore extenditur; adeo ut quando  
contingit, vesica se constringere non  
possit ob nimiam fibrarum disten-  
sionem, et tunc moriuntur. Fumi-  
nata exercitio tantum periculi  
non habet.

Cura.

Cura. Si a calculo ~~infixa~~  
 renium, diuretica præstant. Si  
 a calculo infixa, retrudimus  
 ipsum calamo avenacio quod mol-  
 le est et tamen resistit; vel  
 immittitur catheter, sed gramine  
 præstat. Catheter autem summa-  
 cum circumspunctione adhiberi debet;  
 nam cum ad infixa muscleum uent,  
 ulterius non procedet; quarto digito  
 in annum immisso debet attolliri (ma-  
 nifeste enim sentitur) et iusterius  
 in infixa intendi. Quando uel  
 pus, uel sanguis, uel putrida infixa  
 ceruicem obstruit, possimus eadem  
 materia detinere gramine uel  
 catheteri, sed ulterius in infixa  
 immittendus, quia humor petens  
 alias foramina est obstruit: si  
 autem hoc facere nolimus, materia  
 fundimus

dysuria et  
stranguria.

(250)

131

fundiuntur foliis sambuci aliisque  
quando propter concretulam in  
urethra, excedamus & gypstato  
cum circa caudola.

## Caput 40.

### De dysuria & stranguria.

Dysuria est excretio urinae de-  
pravata; hoc est cum dolore; si  
autem urina parum et guttatum  
excretatur, stranguria est.

Hoc enim affectum sunt saepe in-  
ter se causa mixtae.

Excretitur autem urina, uel quia  
est acerius, uel quia pars nimis  
est sensibilis. acerius est, cum sali-  
cior est; talis autem est ex potu  
multiplici unde dissoluitur hum-

oribus.

inclusa sal, quod etiam in circuns- ~~stranguria.~~  
tria recenti contingit, quia sal non  
tam bene permixtum est quam  
in veteri: uel aceror sit quando  
multa bilis ei permisetur. 5. a  
cantharidibus. 4. Si illi permis-  
eruntur calculi et arcuulae. Pars  
minus est sensiles quando est exco-  
riata ab acuminis, gonorrhœa  
uel calculo.

Signa sunt manifesta. Si a sali-  
matori est ardor: si a calculis  
et arcuulis, id in matula uideat  
est. Dysuria magnum malum est  
est nisi ratione causa.

Cura. Si ab acerori urino, pro-  
punctis decoctum malum. Si a  
urino acerori aut circunfria recenti,

(252)

menstruorum suspicio

nuces moschatae aut lac ming-  
dalarum præstat. Si ab excori-  
atione leui, oleosa iniicienda  
in urethram ut oleum olua-  
rum. Si a gonorrhœa aut  
alio excoriatione, crenor lactis  
in urethram injiciatur, tuncq;  
stidem ad hoc feminis refectione.

### Caput 7.

#### De Uteri affectibus et de Suppressione mensium.

mensium. Suppressione menstruorum est quando  
Monstruorum non fluunt ex qua de-  
greco profus se habent. Non flu-  
unt autem dupliciter vel proler-  
uel secundum naturam. Secun-  
dum naturam non fluunt, qd<sup>o</sup>  
Quando tante

tanta copia non generantur. menstruar.  
 praeter naturam autem fit, vel <sup>suppresso</sup>  
 uitio menstruum, vel uitio par-  
 tis, vel uitio viarum. I. Vitio  
 menstruum fit ratione quan-  
 titatis quando sanguis est nimis  
 paucus, quod faciunt omnia ea  
 quo sanguinem immittunt, ut  
 nimis purgatio, veneficio nimis  
 haemorrhagia vel exercitatio corpo-  
 ris. Vitio menstruum rati-  
 one qualitatis, quando sanguis est  
 nimis crassus ut in cruditate  
 et initio leucophlegmatis.  
 Vitio partis fit quando cor  
 non pellet potenter, quod fit qd  
 debilis est. 3. Vitio viarum  
 quando via angustatur quod fit

principie

menstruor.  
suppressio.

(254)

133

principie ob fugas externum, ex  
melancholia et tristitia, ab ob-  
structione, constructione, compres-  
sione a tumor, etiam aliquando  
ob coaloſcontrari.

Motus. primo pars vis uenient  
postea tardius, postea ualde parum  
aut non emittuntur. prosterintur  
appetitus, dolent lumbis, melancho-  
lica sunt, doloreibus ventis torri-  
piuntur, tum febriculæ, domum  
cachexia. Si tendat ad mortem  
hydropes hoc sit aut tabes ad fa-  
laciem, uel evanescit per os, uel  
medicamentis immunitur donec flue-  
re incipiatur. motus substantia est  
sepi, sed pricipue diuturnus.

Cura. Si deficitur quantitate, tum  
nihil est faciendum si sanæ sunt.  
Si qualitate

nimis Fluxus  
menstruor.

si qualitate poterit datus attenu-  
antia et incidentia, ut sunt arte-  
misia, rubia fructorum et salvia.  
Si contingat utio monentis, ea  
datus que cordi dant pulsus, quod  
fit circa aptum tempus, herba  
vel uino cum eroto. Si uitium sit  
in uisi, datus aperientia ut sual-  
cium uitioli, sulphuris, artemisia,  
chamomili, sabice, rubiam fruc-  
torum. Extrins applicantur que  
fusionem humoris adjuvant, ut apium  
panctaria, salvia, abrotanum que  
adjuvant fusionem. Si iuxta est,  
fumus ex mastiffr. vel pessaria.

## Caput 42.

De nimis menstruorum

Fluxu

Coofa

Causa autem est vel in mobili,  
vel in mouente, vel in ijis. In  
mobili, si quantitate piccat, ita  
ut nimis magna copia fluat: Si  
Ratione qualitatis ob temeritatem  
nimiam ut in febribus ardentibus,  
ex nimio uini usq; vel aromatiuum  
est inhibendum aut sistendum.  
Temperie autem oriri potest vel  
ex nimio calore hepatis, cordis,  
liveris etc. In mouente est uiti-  
um, si cor nimis mondat ut in fe-  
bribus. In ijis uictum est, quando  
uix sunt nimis apertæ, quod fit qd  
rotonta faciunt menstrua et rursum  
fluant magna copia. Dilatantur  
vix ut etiam post abortum vel  
partum difficulterem. Contingit etiam

alij

Nimius Fluxus  
 aliquid sensum parum extellari; menstruor.  
 quod sit quando nas parum est apertus  
 fum. Ut aliquando subitus est effluxus  
 et urinam, quo sit qd' nas  
 urinamenter et multum apertum est  
 qui fluxus tam non dosint qd' urinam  
 in Lipothymiam, quia cor non po-  
 test amplius tollere; si tunc cor  
 deficit, iterum fit fluxus.

Motus. Si ad salutem; consternat  
 sed non subito. Ad mortem subito  
 fluit et sic extinguitur. Ego et  
 Observavi pullam ex mino fluxu  
 duodecim horis mortuam. Quando  
 stillat, parum est priculi: qd' ur-  
 inamenter fluit, multum subest po-  
 ricali.

Cura. Si a copia sanguinis, nr-  
 hil est fatendum. Si ex temitate  
 microscandus est sanguis ~~multo~~ perferri

ex sem.

ex scimibus & frigidis matribus,  
corallis, belo armena, terra le-  
nina. Quando a mino cordis pulsu-  
m habet quaque farrendum. Si à dilata-  
tione utiarum, constringendus est  
sanguis opio integro ad grammum  
unum duo vel tria. deinde suffici-  
quum per interum immittitur per in-  
fundibulum ex gallis, nucibus  
cyprietti. Balnea hæc terrarum no-  
profunt, nam ex mino uteri exic-  
catione incident in Liphymam.

## Caput 43.

### De Fluore albo.

Fluor albus est quando humor  
candidus, flamus vel viscidus con-  
tinuo aut per internalla fluid  
non tempore monstrorum.

Carca

Flor albus

Causa est vel cachexia vel semen  
quod nihil est aliud quam gonorrhœa. Discernitur semen a cachexia,  
quia crassius ut plurimum est.

Ex semine fit quando peccat vel  
quantitate vel qualitate. Quantitate  
peccat quando est nimis copia  
collecta, quare uasa dilatantur, ut  
contingit in ijs que sero nubant.  
Qualitate peccat quando est nimis  
frenuis et uasa sunt aperta, quod  
etiam fit ob fruatum sementem.

Catarrhinia uenit vel ex utero, vel  
ex toto corpore. Ex utero uenit  
ob frigus uteri contractum interius  
vel exterius vel ex passione. Vel  
uenit ex toto corpore, et tunc habet  
omnes hydroperic carnos.

Motus.

*Fluor abortus*

Motus. Et parum madosis sentiantur,  
postea aliquo retardatur, tum magis  
fluit, tum conqueruntur de dolore  
casus lumborum et capitis. (Si illi  
dolor non oratur ex nephritis; quod  
ex urina faciliter constare potest)  
Certum huius fluxus sigmoides est.  
post fit humor fit flauus, tum in-  
ridis et lentes instar lactis con-  
creti. Ad salutem tendit atatu?  
Ad mortem, tumor ventris; vel ex  
nimio fluxu debilitantur. Tardè in-  
cipit et definit. Malum est frequens.  
Cura est difficilissima. Si ex semi-  
nivis, quia dilatata sunt nec difficultate  
curatur. Si ex catarrhynico,  
prouidendum est toti corpori, ut in  
cathexia et hydrope. Si ex utero  
sufficiens ex Thoro et masticha.

*Cap. 44 de abortu.*

*abortus*

Abortus est exclusio foetus ante lo-  
gistinum tempus.

Exoritur autem vel uitio cervicis  
uteri, vel uitio foetus, vel uteri, vel  
a nimis motu humoris, aut partic-  
um corporis feminae.

Vitio cervicis fit quando nimis laxa  
est et molles, ut in ijs que laborant  
fluxu mulieris, vel qua sepe natant,  
vel qua imprudente atrem admittunt.

Vitio foetus; quando uteru parvus  
et foetus Magnus est. quando foetus  
egrotat, tum enim ponderosus est utero,  
vel quia Laborat magna copia san-  
guinis, tum enim foetus obruitur, vel  
quia deficit sanguis, tum non nutritur.

2. quando foetus nimis se mouet, quo-  
dit, quando dolit et egrotat, vel  
quando nimis est fluxus humorum  
ex corpore in uterum, quod fit ex

abortus  
~~~

Abortus

animi affectibus, ut ex ira, terrore.

In utero uitium est, quando fetus  
est, vel nimis est sensibilis ut quando  
laborant utero matricis. 2. Quando  
uasa umbilicalia non bene adherent  
cotyledonibus, vel etiam propter par-  
nitatem uasorum umbilicalium, vel  
 laxitatem cotyledonum.

In mouente uitium est, id mulier  
si nimis mouet, quod fit vel cal-  
entando, ab iectu vel rafsu que exia-  
xit aut matrem corporis motum.

Motus. I. habent dolorem, et labo-  
rant stranguria. discernitur autem  
hic dolor a dolore nephriticus, qua  
partes magis timent. postea con-  
cedit mammilla, tum dolores fiunt  
matrem in posterior parte et per os  
facciam et coquondam: tandem agit  
quedam

quodam excurrit: quo symptomata  
 omnia simul, his, ferue definunt  
 ac redent, postea itorum ortur  
 dolor et sic foetus excluditur.

Abortus periculosior est quam partus.  
 ad mortem definunt nimio fluxu, ad  
 salutem, predilectionis.

Cura seu præcautio abortus consi-  
 fit in sublatione causa. Quando abor-  
 tus instat, mater et foetus reborandi  
 ut aqua Camomomi et Saccharo pr-  
 parum. Dolor Lumborum lenitur  
 cum Euplastro ex Melilotto. Valde  
 fumat ad foetus productionem Eu-  
 plastrum ex Thoriace 3 iij. quod  
 uentri superimponitur.

## Caput 45

### De Mola.

Conformatio vel obliteratur et di-

citur

dicitur sterilitas, vel immunitas,  
et dicitur abortus, vel depravatus  
et vocatur mola.

Mola est moles carnosa profecta  
in utero copia venarum perfusa.  
Dico pro fœtu quia habet secundi-  
nas et via sa umbilicalia.

Causa proxima mola est inordinata  
uniformum constitutio, propter quam  
caro qua ex teruis generari debebat,  
intervis generatur, et membrana  
qua debebant intervallis generari, ge-  
nerantur exterius.

Contingit Hoc vel feminis uitio,  
vel sanguinis monstru.

Vitio feminis si nimis sit debili, unde  
fundacula ex feminis facile compri-  
muntur mola, quia feminis fibrae  
coalescent.

Vitio sanguinis monstru quando  
nimis copioso aut confortim affluit,  
affluit.

Affluit uel ob copiam, uel ob animalia affectus.

Signa eadem ac ueri conceptus: in initio nisi quod reptio uermis uistar, mensis tertio aut hec domine septima, ut in foetu non animaduertitur.

postea gravior mola ad anteruora procumbit, quod et in foetu quidem accedit, sed tum motus foetus sentitur, domo doloris maiores in utero et Lumbis percipiuntur. Haec signa fallere possunt, sed certius si mens. proprio non exernantur.

N. mirum est quod in mulieribus hydropticis sentitur aliquod extrinsecum abdomine corpus brachij uistar quod fit ex opinione nostra, a membrana indurata et exsecata a salsi, uel aqua omentum distendit.

Euentus

Euentus. periculoso est malum  
et mulieres magis in mola quam  
in factu periclitantur.

Cura praeservatoria. Si aliquoties  
mulier laborauerit mola; uxor &  
maritus uti debent somnem augmenta-  
bus, et femina sibi ab animi affe-  
ctibus caueat quia potissima est  
causa.

Cura nulla adhibenda nisi partus  
tempus transcurrit: quia aliquando  
signa mole adsumunt, cum tamen  
est factus. Quare duodecimo mense  
curatio primò instituenda est ipsi  
qua parturi prouident, ut molas  
uolumentur, detractione sabinæ,  
borax, succinum, crocus. Si  
haec non fuant, manu obstetricis  
per partes abstracta.

de sterilitate

## Caput 46.

Sterilitas.

## De Sterilitate.

Sterilitas est conceipiendi ini-  
potentia. sit autem. sit autem  
uel seminis vel sanguinis menstrui  
vel penis uitio.

Vitio seminis sit, quando vel int-  
plum vel nullum est, vel non  
venit ad uterum. Semen deest quod  
non generatur, quod sit vel materiae  
vel efficientis uitio. Semen ineptum  
est si sit nimis crassum, vel aquo-  
sum vel impurum. Quod vero  
semen de sit, vel ineptum sit, ab  
ipsius causis oritur sed magis  
et nimis differentibus. Atque  
hoc sit, vel uitio materiae vel  
efficientis. Vitio materiae, si vel  
deest

debet, ut post evacuationes, vel  
prava est. Virtus in effervescere  
est, si testis non bene elabora-  
rant, vel partes concoctores non  
bene preparant, ut venturulus  
sopar, cor; vel ob frigus vel  
calorem; quod admodum tamen  
rarum est: quamvis male ser-  
habentibus partibus concoctores  
semen inoptum sit, vel deficit:  
Semen tamen semine abundant,  
quod mirum.

Testes etiam male elaborant  
ob carum confricationem, et mala  
conformatiōnēm.

Sterilitas etiam oritur qđo  
semen est improportionatum;  
hoc est cum semina non con-  
veniunt in qualitatibus, vel

qđo

quando mas et foemina non si-  
mul eodem tempore exerunt,  
qua frequentissima est causa.

Non uenit semen ad uterum,  
quando est paralysis membra  
uirilis, uel semen depravatur  
excoriatur, uel qd uteru non  
benio recipit, ut quando aliqua  
est angustia in orificio uteri.

In sanguine monstruo uitium  
est, uel quando non est ob suppos-  
sionem, uel qd nimis est aquo-  
sus; ut contingit in fluxu mu-  
sibri, uel nimis confertum ad  
uterum fluit:

An utero uitium est quando ni-  
mis est frigidus, raro nimis ca-  
lidus aut seicus. Occlusio ute-  
ri

interioris orificij sit ab excrobi-  
oni mensicari, unde invertitur.

Signa: si a uterino sanguine  
uploso, uidetur haec quando ex-  
cretur impurior. Si a suffigidi-  
tate uterina sentiuntur haec tunc  
negat. Vaginae sunt ad venient.  
C. uterini, &c praesertim consistit  
in: ovariis & in arteria spirituosa;  
percutiantur iuxta delicato, ut sunt  
pistos eti. exuta galli, quae mate-  
rebus suppeditant. Ad stimulatio-  
nem infantur grano B Cauthau-  
dum, pupillis nostris. Si in interio-  
rum sunt uirga, baluca et suffumigia  
adferuntur.

### Cap. 41.

#### De difficulti partu.

Partus

Partus difficultas est molesta difficultas  
 et tarda fœtus ab utero exclusio.  
 Contingit hoc vel ratione mo-  
 bilis, mouentis, vel uiarum.

Ratione mobilis fit quando fœtus  
 habet amplos et extensos humeros,  
 quod ex patre ita constituto ut  
 plurimum contingere solet, vel qđo  
 fœtus grandior est, vel male con-  
 formatus, vel morduatur, ut primo  
 cum pēdibus, aut duplicatus, aut  
 alio modo proter naturam predit,  
 aut cum fœtus nubecillas aut  
 mortuus est, vel quando plures  
 fœtus simul excent, tandem cum  
 uasa arteria ad uterum hærent, quod  
 accidit cum grandes ualde solidan-  
 tibus usq; sunt ut olio - - -

Ratione uiarum, cum orificia

partus  
difficultas

( 272 )

142

uteri angustiora sunt, quod fit  
a timore aut schirro, a calculo  
in nefis, a Duro Stercori in re-  
cto intestino, vel cum secundinae  
sunt minus crassae, ut fetus eas  
perturpare non possit.  
Euentus malum magnum est, et  
matres faciliter moriuntur etiam  
post partum, quia cum minus debi-  
les factae sunt, fluxum lochiorum  
non ~~ferunt~~ ferunt, et sic moriun-  
tur, cum omnia se se bene habi-  
re videntur.

Cura si ab angustia utiarum,  
aperientibus utendum, quod optimo  
in hoc casu praestat fomentum  
ex apio, chrysopilio, meliloto. Fer-  
ces ex uno educenda aut obste-  
tricis titillatione manu facta, aut

celo fuci  
cini foli  
essime  
primum  
partus

Lev

leni suppositorio. Vina etiam ex-  
eratur. Ubi hoc factum; si ma-  
ter debilis sit, corroboranda uino  
hisspanico, maluatico, aut aqua  
cynamomi. Deinde ad ostium utriusque  
danda borax, crocus, folia Lauri  
aut cornuta aut umbilico appli-  
cata. Si vero his remedii factus  
non pridet, obstetrix experita  
manum utero immittere debet, et  
factum quantum potest, cum mi-  
nimo doloris extrahere.

Contingit etiam saepè adesse fe-  
bris culans, quæ suis contrarijs cu-  
randa, nisi ingens ad sit periculum  
a debilitate, deque corroboranti-  
bus ex uino, Juscule aromatico  
etc. primo utendum etiam si calda sint.

cap. qd.

arthritis

# Caput 4<sup>o</sup>

## De arthritis.

**Arthritis.** Arthritis est dolor articulorum  
qui per interwalla recurrere aptus  
natus est. ~~et per~~

Subiectum doloris quod affectur  
in articulo, iste tendo, non ligamen-  
tum; sed membrana et praeci-  
pus periostium.

Dolor affectat has partes, quia  
humor aeris certi generis est seru-  
falsum et quod maximum accidit.  
Humor hic ad partes uenit non  
a capite, ut putat Fernelius,  
quia Catarrhus e capite defen-  
dens non potest in partibus interi-  
oribus. Hunc affectum facit: quia  
pruisquid.

articulorum  
dolor

nullitans

accidit

arthritis

principiū eo uenit ad partes alias  
allidit unde dispergitur ac prouide  
quis uis perit sed uenit hic humor  
ex uasis quam maxime tenuiorebus  
et principiū arteriis: ita his hu-  
mor exedit qui ē cordi pellitur.  
Hic humor in uasis est proterna-  
turalis qui ibi generatur, uel ma-  
teria uel effluentis uito.

Vitio materia si quis admittat in  
se tale serum falsum officidum,  
ut et alimonta talia ut sunt, Ce-  
rouisia acida, Vinum Rhenanum,  
quod inde apparet qui a incipientibus  
arthritide laborare post uim rhe-  
nani haustum unum dolor subiungit.

Vitio Effuentis, quando sal et aci-  
ditas maxime dissoluntur in sanguine  
ut nimis

Vitio materia  
falsa vel acidaVitio effuentis  
salon et acerone  
sanguinis dissol-  
uentis

Arthritis.

ut nimis usi nonoris, uini, aromatum,  
nimis studio et exercitio; quod  
apparet in pastorebus et rusticis,  
qui cum in Juuenili etate uochi-  
monter laborant, et postea ditiones  
facti, quieti sedent, hoc malo  
corripuntur, qui a excrementa  
qua transpirare debent, retinen-  
tur.

ob ebullitione  
sanguinis

Excrementa illa generantur plura  
quam debent ob ebullitionem  
sanguinis. Vixum est in uis, si  
sunt apertiores, quod contingit  
cum aliquoties aperta fuerit.

ob partium  
affectione, debilitate.

Vixum est in partibus, cum sunt  
debilos, quod fit ob uenoris et cas-  
sia usum minimum, item si pedes mi-  
nimum refrigerentur.

principia in articulis Quod autem circa articulos hic dolor  
maximus.

arthritis

maxime horat, causa est, et  
propter partium sensibilitatem, et  
qui a uasa ibi sunt motor, magis  
complurantur, et diu rancantur, ac  
proinde sanguis ibi magis sistitur.  
Intervallo ratio uidetur eadem qua  
menstruorum.

Dixi serum cum aciditate, et  
salsedine causam contentum esse,  
qua magnus dolor adesse non po-  
test nisi salsedo aut præcipue aci-  
ditas adsit; nec matris illa acida  
et salsa ad articulos peruenire po-  
test nisi a sero dissolue; sed hoc  
id esse indicant topi. Si sit Iphi-  
as I. solit dolor oris circa os fa-  
cium, aut spinam coxendicis aut  
trochanterem interiorum extre-  
morum. Dolor hic aliquo abit  
aliquo uidit

aliquando redit: vero aut aut  
unum ali tempore solent maximi  
moueri ut et omnis arthritis, pos-  
t haec accipiunt dolores intusissimos  
et durant 3-4 mensos ubi se-  
mel, iterum, tertio hoc redit  
durat per totam uitam, quod exi-  
un non possit ob partis densitatē  
et profunditatem.

In podagra nigri primo impedi-  
mentum sentunt in incessu, hoc  
transit, post 3-4. aut 5 mensos  
redit, et tunc forte dolor in hallu-  
ce habent, sequente autem au-  
tumno dolor nocturnus et in  
cedro tunc nequunt: cum hoc  
aliquoties habuerint, natus tunc  
corripuntur, et in mitio 5 septuages-

Durat: si

Amicus quidam meus poda:  
grā sapustule afflictus  
Sanguisugam undam uel alte-  
ram parti solenti protenus  
applicat magne nunquam non  
cum solamine

## arthritis

si vero malum sit plenus, sex aut  
septem. Vidi Ego met qui in mitio  
in articulis lophos habuerint sive  
doloris qui tandem postea ab maior-  
em accidit resolutionem, maximo  
doloris corripiabantur.

In moxi ipsius paroxysmi primo in-  
hil in parte affecta videntur, postea  
rubedo ortur, tum serotus tumor;  
ubi tumor is factus est, incipit  
desinere dolor et aliquo fibulae  
superponitur, paroxysmus finitur,  
ultimo pedes intumescunt hydro-  
picorum more querum hoc sponte  
deinde desinit.

Euentus. Arthritis est malum  
curatu difficile: Non tamen soli  
morari ante senectatem, insi-  
asthma

asthma supernat.

arthritis

Ischias et cleis agro sunt intensissima mala inter arthritidos, ita ut dolor exasperet omnes dolores excepto calcui dolore.

Cura consistit in præcautione et morbi in paroxysmo curatione. In paroxysme si nihil adhibeamus, ægri postea molles uideant, si aliquid applicas, postea molles se habent. Si enim extrahant humorum eum resolunt, si repellunt, constringunt partes, unde humor datus retinetur, si tamen dolor minor est, debet sedari, quod fit uel uena sectione uel per fugacem; quia sanguinis ebullitionem prohibent; uel sudore quo materia discutitur. purgatores non

paroxysmos:

(282)

Lues uener.

paroxysmo augent. Extrinsecum  
optimum est calofacere vel ad  
fumum vel aqua calida in pa-  
gentis parti applicatur. Optimum  
est radix consolidae applicare  
aut forma Cataplasmatis aut in-  
guenti, quod primo extrahit, ul-  
timo repellit. ad dolorum intensissi-  
mum applicamus cataplasma ex  
malva, althea et hyoscyamo.  
Si dolor Ispadicus his non sedat,  
neuritorum impendunt cumbas  
quod dolorum sedat.

## Caput 49

## De Lue Venera.

Lues uenerea est morbus uenena-

venenatus, contagiosus sui generis,  
 qui se prodit gonorrhœa, vel  
 maculis vel pustulis, vel dolore  
 capitis, ex impuro contrarium con-  
 grossu. Dico morbus venenatus, quia  
 polis alexipharmacis ut Theriaca  
 curatur. pars affecta hic est vel  
 totum corpus, vel aliqua pars.

Afficitur autem totum corpus vel  
 aliqua pars ab humoribus non a  
 spiritibus. Humores si generan-  
 tur in nostro corpore propter  
 contagium, vel ex impuro congre-  
 sione vel ex salina, vel sudore,  
 (quod humorum) contrarium.

Primo hoc malum contagium or-  
 bum est ex Amboina; qui morbus  
 illi est Endemicus et intus acies et

aqua

aque gratus; uerum illis locis non  
ad eos facia est.

Motus primo solit fontis acrimonie  
in exornanda vena; postea labo-  
runt genitrix ea, aliquando tamen non,  
sed hoc raro rarer est, postquam  
ea aliquandiu laborauerint, (quia  
multos sepius non admodum ducunt)  
propter fluorē album) quo sepius  
corripuntur malum ingrauefit,  
et tum primo pustula præsistim  
extra partes genitalis oriuntur, denuo  
tuberculæ sive nodi hinc crusta,  
qua in medio obscurè albent, in  
marginē vero rubent, quibus apertis  
molitus sibi habent: Tum dolor ca-  
pitis uospero exacerbans et dolo-  
res extremitatum brachiorum oriantur;  
postea bulones etiam ad omni marginem

ridunt

magnitudinem, tandem lophi ad magnitudinem arteruli pollicis; ulti-  
mo exalcorantur nares, et quod possimum, difficultissimum curatu est.

Lues Vener.

### Fauces exalcorantur

Euentus. In emaciatis et debilibus malum est difficile curatu sape longo tempore durat: sape non ut in robustis, si ultra sex aut septem menses extundatur cura bona non est.

<sup>luidam</sup> Cura. Purgantia et purgandi ad dunt mercurialia. Luidam sudores provocant, ut Thessalica, guaiaco, sassafras. Verum haec omnes cura aliquando surcent, sed certe non sunt. Melior quidem sed non fida cura est, squia facile reddit sudores in lecto pro lieve est in hili. Optima cura sit per mercurium, non per inguina ta aut emplastra exhibitum, aut

mitis

at  
aut intus datum ad gr. 4 aut 5.  
quod optimum facit mercurius praeci-  
pitatus. Turbith mineralis.

Vlceræ et dolores dissipant curato  
morbo, si vero crusta adfiant, mol-  
uel oleum nitroli applicatur:  
si nodi nolunt discedere, Emplas-  
trum de rannis cum Mercurio duplii  
applicandum.

## C agut 50.

### De Scorbuto s. scœ letyrbæ.

S.corbutum

**S**corbutum uidetur esse morbus  
qui describitur ab Hippocrate, Col-  
lio Egineta sub magnis licetibus.

Vlceræ scorbuticorum et si non nisi pro-  
priis remedii curantur, non tameni  
sunt malignæ; quia ut vlceræ hy-  
droperorum

## Scorbutum

hydropterorum proprio remedio em-  
plastico scilicet de mino, curantur.

Scorbuti subjectum est omnis ter-  
pore nostri pars. Afficitur hi  
humor existens in vasis majoribus, omnes corporis  
in ~~ter~~ vasa his adhaerentibus

ut in Lino, Venera. Vitium humo-  
ris in vasis majoribus est non com-  
moda permixtio seu fermentatio  
humorum; unde contingit ut par-  
tes formos et crassa scorbutum mar-  
uant. hoc contingit vel abun-  
dantia humoris salvi et feco cras-  
si, vel defectu humoris attenuan-  
tis. Abundat autem crassus et  
salvus, cum ultima virtus salvo,  
crasso, et torostris ut Coronaria  
crassa salitis carnis aut fume  
curatis, aetate tali aut aqua vel  
focundo quo adustio quedam in

partebatur

Subjectum  
habet

Corporis  
partes

affitas a vitioso  
humore in majorib.  
vasis existente  
et virina vasa  
afficiuntur

Vitium est crassi-  
tis finali et  
septentrum  
a

Vita Crasso Salvo

## Scorbutum.

(288)

partibus fit, qui ex parte fo-  
bricula vel macrorum humorum alte-  
nans qui deficit, est humor acridus,  
deficit humoris  
andi fermentantis  
ob Lumen obstruit humor acridus deficit ob Lumen ob-  
strum.

structum proscriptus; vicinassis; partes  
undo appetit uitum maximum habent  
in ventriculo et Lumen. In ventri-  
culo quia fermentatio ibi bona o con-  
tingit; undo et (uero) appetitu car-  
ront: in initio tamen famoscent, sed  
falsa fame, propter sal acer, postea  
appetitum perdunt.

In initio pulsus  
Langidus qui  
sufum Langidior  
erudit.  
Sapor salsus in ore  
Lassitudine singulariter  
alborum timent et  
reulerantur gingivae  
de lassitudine et salsum saporum in  
artibus. et habent: quaribz quoqz copia  
sori est; secundum et expununt: pos-  
tura

postea gingiva solent albire; u-  
 rines sunt turbidæ, rubrae qua tarda  
 deponunt sedimentum in fundo; ino-  
 por 3 aliq[ue]d dies. Haec est quia  
 quod tenue tantum est soro permis-  
 tur unde non facile credet. Quare  
 etiam si urina etiam ceteris sed mon-  
 tum deponunt, molitoris coctionis est  
 indicium. Ex his accipiunt apparet postea manula  
lividæ apparet  
 manula linda, quandoq[ue] rubra in facie  
 pedes et alia corporis parte. Tum-  
 pulent ures, stupore, terpore, tumi-  
 tament furoris  
 dangu accipiunt faciem et pedes, tan-et  
pedes.  
 dom caro fœdo ex gingivis succedit.  
 Alterior dolor ingens circa umbilicum  
 et maior sonor quam solit esse a  
 retracto portentosus et nimis doloris.  
 Eventus. Morbus est peritmax, et malum est  
pertinacæ  
 si sit in primo vel secundo gradu,  
 ad 30 annos sepe agri laborant.

In ultime

ad salutem, voti  
ad mortem carnis  
ia aut hydro-  
teminatur.

In ultimo gradu quando dolor in-  
gens et excoecantia carnis magna-  
facta est, fere morientur & aut 7  
septembris. Si ad salutem, terminat  
lysei aut per urinam aut per alii  
excretionem, vel haemorrhagia, si ad  
mortem, rachetica aut hydroptica sunt.

Curat<sup>r</sup> bona  
dieta  
Causa item a  
salti et aquosis  
cibis item a Cibis  
dyspeptis.

Cura proprius consistit in dieta  
et caudant sibi a tali cibo &  
prosperum salvo, non tamen minimum n-  
tuntur oleibus ob aquositatem, ex-  
cepto petroselinum, nasturtio, radibus  
cichori. Vnum etiam sit ualde bo-  
num et uetus parvus, impigrum off-  
ad labores, utantur Cervisia clara  
vel natura vel arcta quod fit si co-  
heres tamariisi si infundantur per  
uertonem quibus fecerit deponuntur. In  
ipsa cura in situenda Louis uenose-  
atio ad 3 p. vel 10. msi. ager sit  
dubiles. postea preparandum est  
corpus

Utransfusione item  
preparabilis et

Corpus pro constitutione agri. Si  
enim calidior, refrigerandum fulapis  
et apozomatibus, in quibus indu-  
tur antiscorbutica, ut cochlearia,  
bekabunga, trifolium aquaticum,  
actinella minima. Quorum duo  
posteriora sunt optima, quia non  
caldificant, et tamen sorum offe-  
cius bonis est ut et cochlearia.

Bekabunga corrumpt ventriculum.

Tempore hysmalis, uti haec deficiunt,  
usurpatim bacca juniperi. Medi-  
camenta haec danda ut in succo qui  
est migratus, vel in decocto seu la-  
ctis seu ceruisie; Ut decoctum Ju-  
niperi etiam bonum est. Si malu-  
sit uale permax, ad trifolium  
aquaticum ducentum, interea  
utendum succo cytri uero qui in  
pharmaco pulsis

## Scorbutum.

(292)

pharmacopolis uix inuenitur, sed illa  
 Nam purgantibus ex pomis Adami experimendus. Quando  
 de Limonibus corpus ita præparatum est, purgari  
 debemus Diatarrhano et parum adda-<sup>t pilulis  
 chia tasteris  
 ritis ducere  
 huius</sup>  
 tur confectionis hamoch nol absynter  
 um etiam proponetur.

Sanguinis fluxus  
 ex ore curatur  
 exercatis roribus  
 arie folijs

Symptoma quo scorbutum comitantur,  
 curanda sunt; ac primum quidem san-  
 guinis affluxus ex ore, si gingivæ  
 attingantur, quod optime exercatis coch-  
 learice folijs pulvinizatis paucæ salis  
 et alumini curatur aut etiam gng-  
 ivæ abstergantur uino rubro; si  
 gingivæ sunt petrosæ, nitrum in suf-  
 ficienti aqua soluitur, et ea aqua  
 gingivæ lauontur, si rare incipit  
 excoriatio, mol nol oleum nitroli  
 optime conductit, quo raro confiran-  
 da. ad dolores pedum nol connub-  
 sient

Nam nitro aqua  
 folijs

Excoecatio vero  
 oboe nitroli

polypus

convulsiones flatulentes decoctum  
Chamaemeli in circunfusia, aerum quia  
hor ingratius, partes solent siccari  
spiritu vini, et sic maculae evanesc-  
ent.

pedum tumor  
derecto chama-  
meli vel spiritu  
vini.

## Caput 51.

### De Polypo,

*P*olypus est fungosa exerosio-  
nia in naribus a Lesione membrana-  
rita. Membrana redditur a catar-  
rho atri influente.

Motus et grandis, et loquela diffi-  
cilioz redditur, postea emunctio san-  
guinis et mox exorsientia carnis fungimus  
superuenit. Si summa pars membrana  
sit affecta, retrocedit dum caput

polypus  
incipit

grandis  
et  
sanguinis  
emunctio  
ad posteriora

polypus.

297

153

ad posteriora fluctit, si media  
non item, si infra, oculis videti  
potest.

Initio  
farcta est uera  
in progressu  
non item.

2°.

purgandum

2°:

paluus res. rubr.  
rum Thoro est  
aspergendum.

item

alio uitrioli  
illuminandi

Radix chiripatur  
cantus actuali non ex ferro aut  
cantus artifici argenteo sed ex ferri bractea plana  
obvoluta Belgis Blick.

cap. 52.

## Caput 2.

Cancer.

## De Cancero.

V

CANCER est tumor durus instar Cancer  
cartilaginis pectoris. ~~ad~~ imponentum  
quotidie capiens; quamquam et con-  
tingat aliquando imponentum non  
caperet et tum est schirus; durus...  
et incremento a schirro differt. Tu-  
mor hic caudicatus et aliquando  
grani; aliquando cui est magnitu-  
dine.

Causa proxima est sol et terra  
concreta a quibus serum est for-  
gatum: illa materia uideatur in  
soloni constitutionem, quando ipsa  
pars uol materia est canerosa. Pars  
canerosa est ex constitutione que  
postea exercitat et canorum facit.  
materia

affinitur ex solu-  
et terra.

Cancer.

Materia Canceris est sal et terra  
in nostro corpore abundans ex multa  
crasso, salso, morto &c.

Materia haec facit cohercum cu  
quedam particula concrecent, reli  
quam in vicinia manet sorsum,  
et ideo circa Cancerum sunt fons,  
et cum illis cancri ita increvit  
ut circulationem impediatur, inflam  
mationem et suppeditetur facit, qua  
que medicus non debet Vereri aperte  
re; sed tamen in fonsis viciniis aspi  
cio faciendo, ~~et~~ postea inflamma  
tio haec in abscessum aut ulcus  
desinat, Ulcus canceris sum dicatur.  
Si duratus haec circa uenas maiores  
sit, istas instar podium Canceris  
descendet ob circulationem impedi  
tum, et hinc nomen cancer obtinet.

Si autem

(297)

Si autem prope membranam <sup>accat</sup> existat, summos dolores.

## Cancer.

Motus. Cancer semper in pretius  
abit, et cum ad mortem tendit,  
haemorrhagiam existat cum-  
pende uenae matores, uel ma-  
cir, aut dolorebus erat.

Cura. Initio fecetur uena  
et detur praeparans et purgans  
molantholiam. Alius semper  
sit aperta. Cum tumor  
non creferit, quod raro pres-  
tat abstinere, et cancre  
ne dolores existentur. Si ex-  
eat, appendicium tolli ne possit  
au non. Si immobiles sit, et  
partibus carnosis circa uasa

minima haecat, tollendus est. Tu  
fissim⁹ autem omnium tollitur is  
qui a contusione ortus sit, qui  
non habet causam intus fonsenam.  
si tollere non possumus, placamus do-  
lores emplastio de Ramis cum mer-  
cure et aliis Lenioribus discenti-  
bus, si exsiccatus tam est, neq; met-  
talicis sed fuligine fabronum aut plu-  
bo usq;. contra dolores opiate opti-  
ma sunt.

Je houe Zebaoth  
Individua et sacra sanctæ

Trinitati

Decus in Eternum.


Amen.

Johannes Colhoun.

octavo Eidi

decembreis

Anno 1652



Gurgina Abbatiss<sup>a</sup> Glasenensis

156

S. ual.

Quercus cui insist<sup>a</sup> Ruocula: a Later<sup>e</sup> ~~lubo~~<sup>Campana</sup>  
ad Radrem Salmo or<sup>a</sup> exiens amulum  
aurorum


Salmo Maris, terrag; arbos, Avis aëris Vrbi  
Promittunt, quicquid tina clementa ferunt.  
Et Campana frequens celebet quod minimis aras  
Vrbis) superisse polo non peritura ocel.  
Neb*e* quis indubitet sociari aeterna Caducis  
Annulus id pignus Contigiale notat.

Raptim effudit R. Magnus M.D.

Numerus climacteriorum usque ad diebus ad quem per  
annos gradus (ad) eius trans scala graduata  
ascendimus: qualis est numerus qui ex novem  
milia annis resultat, nam annos ter sumpta  
coacti terminum. Sequitur in se ductus nonena  
zim. Nonarius a. novis sumptibus consistit  
unum et octoginta, qui est numerus climacteri  
orius. Hunc a numerum in binaria infra annis  
maxime fundabilem esse a veteribus probatum  
est, quippe qui raro sui vita, aut fortunam  
pericolo soleat transmitti. Nec e. anno etatis  
Plato philosophus, Diogenes Cynicus, Diogenes  
Heracleotes, Eratosthenes geometra Nean  
sum obierunt: Alii annum etatis sexagesimum  
tertium impensis perirebant. Heracut qui  
consistat ex septies tribus trii multiplicatis, qui  
etiam climacteria vocabant. Vnde Augustus  
Caesar nepotem latum natalem domum suum  
celebrare habet, quod annum ullam omnibus  
familias preuulsum esse fecit. Tunc etiam qui  
annum uncequinguefimum maxime fundebant  
partim

21 / 42 / 49 / .65 / 81, 84

~~27. C. i. l. a. 2. 1. 10. m. p. 1. g. g. r. o.~~  
~~c. o. l. o. p. h. e. n. i. a. l. u. p. d. f. p. a. 3. j.~~  
~~p. d. l. u. p. l. b. a. 3. j. m. i. f. m. s. t. h. a. 3. 1. 3.~~  
~~c. o. r. i. 3. m. f. E. m. p. l. S. A.~~



Willa Gordan de

A Pitti minne

te m' fu' vattu'

rech de p' d' p' p' e'

meus faze fu' d' corso' ame

l'ompon' parrot' se faze' d'

d' faze' d' O' D' G' f' f' f'

monumento p' d' d' d' d' d' d' d'

monumento p' d' d' d' d' d' d'

Cona 90668

